

分枝的聚伞花序，圆锥式排列，长10—15厘米，宽4—10厘米，分枝极扩展，常蜿蜒状；总花梗纤细，长2—4厘米；花4数，具花梗；萼管卵形，长约0.7毫米，萼檐裂片三角形，长约0.4毫米；花冠漏斗形，长3毫米；花柱伸出，柱头2裂。蒴果近球形，顶部平，成熟时开裂为两个果片，果片腹部直裂，内有种子数粒；种子具棱，细小。花期7—9月。

产于广东（信宜、高要、台山）及广西（防城、浦北）；生于林下或山谷溪旁，有时亦见于湿润的山坡上。模式标本采自广东高要鼎湖山。

19. 金草（海南植物志） 图版9：5—9

Hedyotis acutangula Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. **4**: 171. 1852; Seem. Bot. Voy. Herald 382, t. 85. 1856; Benth. Fl. Hongk. 148. 1861; Maxim Mél. Biol. Acad. Sci. St. Pétersb. **11**: 782. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 372. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 127. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **9**: 44. 1930; 海南植物志 **3**: 303. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 216, 图 5845. 1975. —*Oldenlandia acutangula* (Champ. ex Benth.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 292. 1891.

直立、无毛、通常亚灌木状草本，高25—60厘米，基部木质；茎方柱形，有4棱或具翅。叶对生，无柄或近无柄，革质，卵状披针形或披针形，长5—12厘米，宽1.5—2.5厘米，顶端短尖或短渐尖，基部圆形或楔形；中脉明显，侧脉和网脉均不明显；托叶卵形或三角形，长3—5毫米，干后常外反，全缘或具小腺齿。聚伞花序复作圆锥花序式或伞房花序式排列，顶生，分枝具棱或具翅；苞片披针形，广展；花4数，白色，无梗，萼管陀螺形，长约1毫米，萼檐裂片卵形，比萼管短；花冠长约5毫米，冠管长2.2—3毫米，喉部略扩大，中部以上被绒毛；花冠裂片卵状披针形，稍短于管或与管等长；雄蕊生于冠管喉部，内藏，无花丝或花丝极短，花药线状长圆形，两端截平；花柱与花冠近等长，被粉末状柔毛，柱头2裂，裂片近椭圆形，粗糙。蒴果倒卵形，长2—2.5毫米，直径1—1.2毫米，顶部平或微凸，宿存萼檐裂片长约0.5毫米，成熟时开裂为2个果片，果片腹部直裂，内有种子数粒；种子近圆形，具棱，干后黑色。花期5—8月。


产于广东、海南和香港等地；生于低海拔的山坡或旷地上。本种在广东和香港极为常见，但在海南则只见于万宁县，植株不多。国外分布于越南。模式标本采自香港。

全株入药，有清热解毒和利尿之效，对淋病、赤浊亦有一定疗效。据1967年再版的《中兽医常用手册》记载，本植物治疗猪丹毒效果良好。

20. 阳春耳草（华南农业大学学报）

Hedyotis yangchunensis Ko et Zhang in Journ. S. China Agr. Univ. **16**(4):45. 1995.

直立无毛亚灌木状草本，高30—50厘米；茎粗壮，上部方柱形，极粗糙，下部近



图版 9 1—4. 大苞耳草 *Hedysotis bracteosa* Hance: 1. 植株; 2. 花; 3. 花冠展开; 4. 花萼、花柱和柱头。5—9. 金草 *Hedysotis acutangula* Champ. ex Benth.: 5. 花枝; 6. 托叶; 7. 花冠展开; 8. 花萼、花柱和柱头; 9. 蒴果。(余汉平绘)