

圆柱形，略平滑；节间距离很密，长0.8—1.5厘米。叶对生，密集枝顶部，厚纸质，长椭圆形或长圆形，长8—12厘米，宽3—4.5厘米，偶有仅长3厘米，宽1厘米，顶端钝或近圆形，基部下延至叶柄基部；中脉在下面粗而凸起，在上面纤细而下陷，侧脉每边5—7条，与中脉成锐角斜向上伸；叶柄长1.5—2厘米；托叶阔三角形，长1.6厘米，基部宽0.8毫米，边缘和顶部均撕裂成狭窄裂片。花序顶生，由多数具短梗的花密集成圆球状，直径2—2.2厘米，复由2—3个小头状花序组成复聚伞式；总花梗长5—7厘米，顶部有小叶1对并具卵形、长1.5厘米、宽5—6毫米的苞片和线形、长5—7毫米、宽2毫米的小苞片；花早落。蒴果椭圆形或近圆球形，膜质，干后灰褐色，长约3毫米，宽2—2.2毫米，有长2.5—3毫米、粗壮的果柄，成熟时开裂为2个果片，每个果片腹部直裂，内有种子数粒；宿存的萼檐裂片披针形，长3—3.5毫米，宽1.2—2毫米，具脉纹，顶部渐尖；种子细小，具棱，干后黑色。 花果期4—6月。

产于广东省阳春县河尾山；生于海拔400米的山地或山谷疏林中。

21. 拟金草 (新拟)

Hedyotis consanguinea Hance Ann. Sci. Nat. Ser. 4. Bot. **18**: 221. 1862; Maxim. Bull. Acad. Sci. St. Petersb. **29**: 162. 1883 et in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. **11**: 782. 1883; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 127. 1912; Merr. et Metcalf in Journ. Arn. Arb. **23**: 228. 1942. ——*Oldenlandia consanguinea* (Hance) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 292. 1891. ——*H. lancea* Thunb. ex Maxim. Bull. Acad. Sci. St. Petersb. **29**: 161. 1883 et in Mém. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. **11**: 780. 1883. ——*O. lancea* (Thunb. ex Maxim.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 292. 1891.

直立草本，高30—40厘米；茎不分枝，纤细，无毛，干后变灰黄色，具微棱。叶对生，近无柄，披针形或长卵形，长2—3厘米，宽0.8—1厘米，顶端渐尖，基部楔形，两面无毛，干后边缘微背卷；中脉在上面下陷，疏被短柔毛，侧脉每边2—3条，极不明显；托叶长卵形，渐尖，边缘具疏离小腺齿。花序顶生和生于上部叶腋，为聚伞花序排成圆锥花序式或总状式，长3—4厘米，有时基部有1对小叶；总花梗长2—3厘米；花4数；萼管长1.2毫米，萼檐裂片披针形，长0.8毫米；花冠外面无毛，里面被疏而透明短毛，冠管长2—2.5毫米，裂片披针形与冠管等长；雄蕊着生于喉部稍下，内藏或伸出；花柱长伸出或内藏，花柱伸出的则花丝比较短，反之则比较长，柱头浅2裂。蒴果椭圆形，连宿存萼檐裂片长达3毫米，直径2毫米，成熟时开裂为两个果片，果片腹部直裂，内有种子多粒；种子细小，具微棱，干后种皮黑褐色。 花果期6—8月。

产于广东、福建、香港和澳门；生于草地或水沟旁，不多见。模式标本采自澳门。

22. 剑叶耳草 (中国高等植物图鉴) 图版7: 7—10