

子多粒；种子具棱。 花期 4—8 月。

产于广东；生于疏林下，少见。模式标本采自广东广州白云山。

24. 香港耳草 (新拟)

Hedyotis vachellii Hook. et Arn. Beech. Voy. 194. 1833; Benth. Fl. Hongk. 147. 1861; Maxim. Mém. Biol. Acad. Sci. St. Petersb. 11: 783. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 376. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 127. 1912. — *Oldenlandia vachellii* (Hook. et Arn.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 292. 1891.

直立亚灌木状草本，高 30—40 厘米，全株无毛；茎基部木质；枝圆形或具不明显的棱。叶对生，具短柄或生在枝上部的叶无柄，草质，长圆状披针形，长 4—7 厘米，宽 1—2 厘米，两端短尖；中脉在上面微凸，在下面稍阔而平滑，侧脉极不明显；叶柄长约 2 毫米，粗壮；托叶三角形，顶端短尖，具小缘毛。花序顶生，为多歧分枝的聚伞花序，长 4—4.5 厘米，宽约 3.5 厘米；总花梗长 2 厘米，第一次分枝长 1.5 厘米，第二次分枝长 0.8—1 厘米；苞片披针形，长 0.5—0.8 毫米；花 4 数，具短梗；萼管陀螺形，长约 0.5 毫米，萼檐裂片披针形，顶端钝，与管近等长，扩展；花冠白色，冠管长约 3 毫米，喉部略扩大，里面被长疏毛，花冠裂片卵状三角形，长约 2 毫米，无毛；雄蕊突出，花药线状长圆形，长 1.2 毫米；花柱内藏。蒴果近球形，直径 1.8 毫米，成熟时开裂为两个果片，每个果片腹部直裂，内有数粒褐色的种子。 花期 6—8 月。

仅见于香港的新界大澳。

25. 大帽山耳草 (新拟)

Hedyotis bodinieri Lévl. in Fedde Repert. Sp. N. ov. 11: 64. 1912. — *Oldenlandia bodinieri* (Lévl.) Chun in Sunyatsenia 1: 310. 1934; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 16: 1936.

草本或亚灌木；小枝被柔毛。叶膜质，有明显的叶脉，干后边缘不反卷。花具梗，排成短的聚伞花序；萼檐裂片近线形，短尖，与花冠管等长；花冠白色，花冠管略长于花冠裂片；雄蕊不突出于花冠管外。 花期 5 月。

产于香港大帽山；生于山顶上。模式标本采自香港新界大澳。

本种未见过标本，仅看过照片。据原种说明，本种相似 *Hedyotis lancea* Thunb. ex Maxim.，因此暂置于二裂果组内。

26. 大众耳草 (海南植物志) 图版 7: 1—6

Hedyotis communis Ko in Fl. Hainanica 3: 301, 579. 1974.

直立无毛亚灌木或草本，高 1—1.5 米；茎粗壮，上部方柱形，下部圆柱形，节间距离通常短。叶对生，纸质，狭长圆形或狭椭圆形，长 10—15 厘米，宽 1.5—2 厘米，花枝上的叶狭小，长 1—4 厘米，宽 1.5—5 毫米，顶端长渐尖，基部楔形，沿叶柄下