

延；中脉在上面平坦或微下陷，侧脉每边 6—8 条，与中脉成锐角斜向上伸，上面不明显，下面略明显；叶柄长 1—1.5 厘米；托叶三角形，长 11—13 毫米，宽 3—4 毫米，顶端长渐尖，边缘偶具小腺齿。花序腋生和顶生，为圆锥花序式排列的聚伞花序，生于具小叶的枝上；枝腋生，长 11 厘米，有时长达 24 厘米；苞片成对生于每个圆锥花序梗的基部，线形或线状披针形，长 4—8 毫米，宽 0.5—1 毫米；花 4 数，具短梗；萼管近倒卵形，长 1—1.5 毫米，萼檐裂片狭三角形，长约 2 毫米，顶端长渐尖；花冠白色，管形，长 5.5—8 毫米，管长 3.5—4.5 毫米，喉部被髯毛，花冠裂片长圆形，长 2—2.5 毫米，顶端短尖；雄蕊生于冠管喉部，花丝极短，花药突出，长圆形，长约 1.2 毫米；花柱长 3—4 毫米，柱头 2 深裂，裂片棒锤形，被微柔毛。果倒卵形或近球形，连宿存萼檐裂片长达 5—6 毫米，直径 2—2.5 毫米，成熟时开裂为两个果片，每个果片腹部直裂；种子 2—4 粒，细小，干后褐黑色，具小瘤体。花期几乎全年。

产于海南昌江、东方、乐东和崖悬等地；喜生于山谷、溪旁的腐殖质丰富的土壤上。模式标本采自海南东方。

27. 粗毛耳草 (新拟) 图版 10: 6—9

Hedyotis mellii Tutch. in Rep. Bot. Dept. (Hongkong) 1914: 32. 1915. — *Oldenlandia mellii* (Tutch.) Chun in Sunyatsenia 1 (4): 313. 1934. — *Hedyotis speciosa* Hand. -Mazz. in Sitzgsanz. AK. W. W. 58: 93. 1921. — *H. wulsinii* Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 17. 1927. syn. nov.

直立粗壮草本，高 30—90 厘米；茎和枝近方柱形，幼时被毛，老时光滑，干后暗黄色。叶对生，纸质，卵状披针形，长 5—9 厘米，有时过之，两面均被疏短毛；侧脉每边 3—4 条，明显，与中脉成锐角向上伸出；托叶阔三角形，被毛，顶端锥尖或 3 裂，两侧的裂片短，边全缘或具长疏齿，齿端具黑色腺点。花序顶生和腋生，为聚伞花序，多花，稠密，排成圆锥花序式，连同总花梗长 3—10 厘米；总花梗长 2—5 厘米，有狭小的苞片；花 4 数，与花梗均被干后呈黄褐色短硬毛；萼管杯形，长约 3 毫米，萼檐裂片卵状披针形，短尖；花冠长 6—7 毫米，冠管短，长 2—2.5 毫米，里面被绒毛，花冠裂片披针形，长 4—4.5 毫米，顶端外反；花丝下部被长柔毛，花药长圆形，罕有伸出冠管外；花柱无毛，长突出，柱头头状，微 2 裂。蒴果椭圆形，疏被短硬毛，长约 3 毫米，脆壳质，成熟时开裂为两个果片，果片腹部直裂；种子数粒，具棱，黑色。花期 6—7 月。

产于广东、广西、福建、江西和湖南等地。生于山地丛林或山坡上。模式标本采自广东，具体地点不详。

28. 清远耳草 (新拟)

Hedyotis assimilis Tutch. in Rep. Bot. Dept. (Hongkong) 1914: 32. 1915. — *Oldenlandia assimilis* (Tutch.) Chun in Sunyatsenia 1: 310. 1934; Hand. -Mazz. in

Beih. Bot. Centralbl. **56** (B): 464. 1937.

直立分枝草本，高 30—40 厘米，粗糙，基部木质；枝方柱形。叶对生，纸质，披针形，长 5—9 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，顶端长渐尖，基部楔形，两面粗糙；侧脉每边 4 条，极纤细，在上面下陷，与中脉成锐角向上伸出；叶柄长约 3 毫米；托叶阔卵形，长约 3 毫米，边缘常 4—6 深裂。聚伞花序圆锥式排列，腋生和顶生，通常比叶短，有花数朵；苞片小，狭窄；花 4 数，白色，长 6—8 毫米，有 1—3 毫米长的梗；萼管无毛，萼檐裂片卵形，短尖；花冠深裂，裂片披针形，顶端钝，比冠管长，外面无毛，里面和花丝均被髯毛；花柱长伸出，中部以下被髯毛。蒴果椭圆形，连宿存萼檐裂片长约 3 毫米，成熟时开裂为两个果片，每个果片腹部直裂；种子多数，具棱，干后黑色。花期 4—5 月。

产于广东清远和从化；生于杂木林内或沟谷两旁的斜坡上。模式标本采自广东清远。

29. 细梗耳草 (新拟)

Hedyotis tenuipes Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 375. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 128. 1912. ——*Oldenlandia tenuipes* (Hemsl.) Kuntze, Rev Gen. Pl. **1**: 292. 1891.

直立铺散草本，除花冠和叶的中脉被毛外，几全株无毛；茎和枝圆柱形，节间延长。叶对生，具短柄或无柄，纸质，狭披针形，长 2.5—7 厘米，宽 1—2.5 厘米，顶端长渐尖，基部楔形；中脉上面被短柔毛，侧脉每边 3—4 条，不明显，与中脉成锐角向上伸出；托叶卵状三角形，长 2—3 毫米，顶端短尖，全缘或具小齿。聚伞花序圆锥式排列，柔弱、扩展，松散，顶生和腋生，与叶等长或过之；苞片小，极纤细；花 4 数，具纤细、柔软、长 5—6 毫米的花梗；萼管陀螺形，长 2 毫米，萼檐裂片线状披针形，长 1.5—2 毫米，短尖；花冠白色或紫色，漏斗形，长 6—7 毫米，冠管长 2—2.5 毫米，花冠裂片披针形，顶端微钝，外反，长约为冠管的 3 倍，里面全部被毛；花柱无毛，长突出，长 6—7 毫米，柱头近头状。蒴果近球形，长约 2 毫米，脆壳质，成熟时开裂为两个果片，每个果片腹部直裂；种子多粒，具棱，干后黑色。花期 6—7 月。

产于广东乐昌、大埔和福建厦门等地；生于沙地或疏林下瘠土上。

Hemsley 发表本种时没有指定模式，仅列举广东和福建所采的两号标本：陈念劬 42996 和曾怀德 2144900。

30. 中华耳草 (海南植物志) 图版 8: 1—7

Hedyotis cathayana Ko in Fl. Hainanica **3**: 302. 579. 1974. excl. tab. 736.

无毛、直立亚灌木，高 50—80 厘米，有时高达 100 厘米；茎粗壮，方柱形。叶对生，纸质，长圆形或椭圆状长圆形，长 16—20 厘米或过之，宽 3—6 厘米，顶端长渐尖，基部阔而下延；中脉初时带紫色，下部宽达 3 毫米，在上面凹入，侧脉每边 7—8