

条，纤细，与中脉成锐角向上伸出，不明显；托叶阔三角形，长4—8毫米，宽6—12毫米，顶端短尖，全缘或具疏腺齿。花序腋生，无总花梗或具总花梗，为圆锥花序式或团伞花序式，罕为伞房花序式排列的聚伞花序；苞片线状披针形，长1—4毫米；花4数，有长1—1.2毫米的花梗；萼管倒卵形，罕有近球形，长1.5—2毫米，萼檐裂片长短不等，狭三角形或圆形，长2—3毫米，顶端钝；花冠白色或浅绿色，漏斗形，长8—9毫米，喉部被髯毛，花冠裂片长圆形，长3—4毫米，顶端钝；雄蕊生于冠管喉部，花丝比花药短，花药长圆形，长1.5毫米，两端钝；花柱长4—6.5毫米，柱头2裂，裂片近椭圆形，被微柔毛。蒴果长2—3毫米，直径1.5—2毫米，宿存萼檐裂片长约为蒴果长度的2倍，成熟时开裂为两个果片，每个果片腹部直裂；种子4—6粒，微小，具棱，干后黑褐色，有乳头状小凸点。花期几乎全年。

产于海南万宁、陵水、保亭、崖县、琼中、定安等县；生于沟谷和溪涧两旁湿润土壤。模式标本采自海南保亭。

31. 粤港耳草 (新拟)

Hedyotis loganioides Benth. Fl. Hongk. 149. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 374. 1888; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 127. 1912. — *Oldenlandia loganioides* (Benth.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 292. 1891.

直立、多年生草本，高约30厘米，无毛；枝圆柱形或具不明显的棱，嫩时略扁。叶对生，纸质，长圆形或披针形，长2.5—5厘米或稍过之，宽1.4—3厘米，两端短尖；除中脉外，其余的叶脉在下面均不凸起，侧脉每边3—5条；叶柄长约4毫米；托叶卵状三角形，全缘。花序腋生，为三歧稠密聚伞花序，有花10—20朵，具长14—20毫米的总花梗；花4数，具极短的花梗；萼檐裂片线形，比花冠略短；冠管短而纤细，内外无毛。蒴果椭圆形，连宿存萼檐裂片长约4毫米，宽2—2.3毫米，成熟时开裂为2个果片，每个果片腹部直裂；种子很少。花期不详。

产于香港和广东。模式标本采自香港。

32. 疏花耳草 (新拟) 图版6: 7—10

Hedyotis matthewii Dunn in Journ. Bot. 47: 376. 1909; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 128. 1912. — *Oldenlandia matthewii* (Dunn) Chun in Sunyatsenia 1: 312. 1934. — *H. acuminatissima* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 159. 1918.

直立分枝草本，高30—75厘米，除花冠外，全株均无毛，基部微带木质；茎的下部圆柱形，上部和老枝均为方柱形。叶对生，具短梗，纸质，通常长7厘米，宽1—3厘米，顶端长渐尖，基部短尖或楔形；侧脉每边3条，与中脉成锐角向上伸出，上面下陷，小脉少而疏散，不明显；叶柄长约3毫米；托叶卵状三角形，长约2毫米，边缘具小腺齿或深裂，顶端通常3裂。花序顶生和腋生，为二歧分枝的聚伞花序，略松散，有