

长约1毫米；花4或5数，有长2毫米的花梗；萼管陀螺形，长1—15毫米，被稀疏粉末状柔毛，萼檐略扩大，裂片长圆状卵形，与萼管近等长，顶端钝或近短尖；花冠紫色或近粉红色，冠管长7—10毫米，外面被粉末状微毛，里面被疏柔毛，裂片长圆状卵形，长约2毫米，顶端钝，有内弯的喙；雄蕊生于冠管喉部，花丝极短，花药内藏，线形，两端钝；花柱长约5毫米，中部以上分裂，分裂部分线形，长约2毫米，被毛。蒴果近球形，直径约2毫米，顶部平，干时黑色，有长约1.5毫米的萼檐裂片，成熟时开裂为2果片，果片腹部直裂；种子数粒，具棱，干后变黑褐。花期5—9月。

产于海南陵水、乐东、东方等县；生于山谷两旁的斜坡或灌丛中。国外分布于越南。模式标本采自海南陵水。

43. 艳丽耳草 (新拟)

Hedyotis pulcherrima Dunn in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 127. 1912; 中国高等植物图鉴 **4**: 216, 图 5846. 1975. — *Oldenlandia pulcherrima* (Dunn) Chun in Sunyatsenia **1**: 314. 1934.

多年生矮小直立草本，基部稍木质，高20—30厘米；茎和枝圆柱形，被粉末状柔毛。叶对生，纸质，卵形，长1.5—5厘米，宽5—20毫米，顶端短尖，钝头，基部圆形，边缘背卷，除上面中脉被微毛外，全部无毛；侧脉每边3—4条，与中脉成锐角斜向上伸出，上面略明显，下面不明显；叶柄长4—6毫米；托叶细小，肾形或三角形，长约1毫米，被粉末状柔毛。花序生于枝顶，无总花梗，有花3—4朵，罕有单花；小苞片披针形或匙形，长约2毫米；花4数，有长约2毫米的花梗，被粉末状柔毛；花萼长5毫米，萼檐裂片披针形，比管长；花冠漏斗形，长16毫米，浅紫色，花冠裂片长圆形，长4—6毫米，顶端短尖，扩展，里面被毛；雄蕊生于冠管喉部，内藏，花药长圆形；花柱线形，略短于花冠管，柱头2裂，裂片外弯。蒴果卵形，脆壳质，成熟时开裂为2果片，果片腹部直裂，内有种子数粒。花期6—7月。

产于广东饶平；生于路旁旷地上，少见。

44. 海南耳草 (海南植物志)

Hedyotis hainanensis (Chun) Ko in Fl. Hainanica **3**: 305, 580. 1974. — *H. oligantha* Merr. in Philip. Journ. Sci. **23**: 266. 1923, non *H. oligantha* Merr. op. cit. **17**: 431. 1921. — *Oldenlandia hainanensis* Chun in Sunyatsenia **1**: 311. 1934.

直立灌木，高约30厘米；枝和小枝圆柱形，被暗污色短柔毛。叶对生，纸质，近椭圆形或卵形，长1—2.5厘米，宽8—15毫米，顶端锐尖，基部阔楔形，边缘干后微背卷，两面无毛或下面中脉有不明显柔毛；侧脉每边约3条，极纤细，不明显，与中脉成锐角弯拱向上斜伸；叶柄长约2毫米，被暗褐色柔毛；托叶被毛，卵形，长约0.5毫米，基部合生，顶部3裂，裂片短而狭窄。花5数，顶生或生于上部叶腋，通常单生或成对，无梗；萼管卵形，长约2毫米，被微柔毛，萼檐裂片狭披针形，长3—3.5毫米；