

藤状灌木；老茎光滑无毛；小枝幼时有明显的纵槽，槽内常有短硬毛。叶对生，纸质，披针形或阔披针形，长3.5—7厘米或过之，宽1.5—3厘米，顶端短尖或短渐尖，基部楔形或阔楔形，上面仅在中脉上有稀疏粗伏毛，下面被毛长而硬，罕无毛；侧脉明显，每边3—4条，与中脉成锐角伸出，几乎直伸向上；叶柄略宽，长2—5毫米；托叶被毛或无毛，基部合生，宽阔，顶部撕裂成3—5条刚毛状的裂片。花序顶生，为伞房花序式排列的聚伞花序，有长2—3.5厘米的总花梗；苞片微小或缺；花4数，有长1—3毫米的花梗；萼管半球形或陀螺形，长1—1.4毫米，萼檐裂片披针形，具羽状脉，与萼管等长或略长，顶端短尖，花后外反；花冠白色或绿白色，管形，长约3毫米，被粉末状柔毛，喉部密被白色硬毛，花冠裂片披针形，长于冠管，顶端内弯；雄蕊生于冠管近基部，花丝长0.8—1毫米，花药伸出，近长圆形，两端钝；花柱微伸出，被白色柔毛，柱头厚，2裂。蒴果球形，略扁，宽2—2.5毫米，无毛或被疏毛，顶部隆起，有长2—2.5毫米、外反的宿存萼檐裂片，成熟时开裂为2果片，果片腹部直裂；种子多数，具棱，干后黑褐色。花期6—8月。

产于海南海口、临高、澄迈、保亭、万宁、文昌、陵水和儋县等地；生于疏林下或山坡灌丛中。模式标本采自海南海口市郊区。

据《广东药用植物手册》记载，全草入药，有滋补、祛风湿、强筋骨、治跌打等疗效。对风湿麻痹、腰腿酸痛等疾病均有一定的疗效。

#### 47. 头状花耳草 (新拟) 养花黄连 (云南曲靖)、凉喉茶

*Hedyotis capitellata* Wall. ex G. Don, Gen. Syst. 3: 527. 1834; Kurz in Journ. Asiat. Soc. Bengal Pt. 2. 46: 135. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 56. 1880; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 373. 1888; Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 408. 1916; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 245. 1917; Ridl. Fl. Malay Penins. 2: 46. 1923; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 234. 1924. — *Oldenlandia rubioides* Miq. Fl. Ind. Bat. 2: 353. 1857. — *O. capitellata* (Wall. ex G. Don) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 292. 1891. — *O. capitellata* var. *glabra* Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 138. 1923.

##### 47a. 头状花耳草 (原变种)

##### var. *capitellata*

高大藤状草本，全株无毛，干时淡绿色；茎和枝圆柱形或方柱形。叶对生，膜质，卵形或椭圆状披针形，长4—10厘米，宽1.5—3厘米，顶端长渐尖，基部楔形，两面平滑；侧脉每边4条，极纤细而明显；叶柄长2.5—3.5毫米；托叶极短而阔，锐尖或具小齿。花序通常顶生，为三歧分枝金字塔形，分枝彼此远离，平伸；总花梗长约5厘米；花4数，无梗，聚合成一直径6毫米小头状体；花萼小，钟形，萼檐裂片长圆形，短尖；花冠白色，管形，裂片长圆形，里面有髯毛。蒴果球形，直径2—3毫米，顶部