

9. 匍匐草本，下部节上生根；蒴果球形；无指状撕裂小苞片

..... 8. 广东新耳草 *N. kwangtungensis* (Merr. et Metcalf) Lewis

1. 紫花新耳草 (新拟) 图版 15: 1—6

Neanotis calycina (Wall. ex Hook. f.) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 37. 1966. — *Anotis calycina* Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 73. 1880.

一年生直立近无毛草本；茎纤弱，具槽纹，高 10—20 厘米，常近基部分枝。叶披针形至卵状披针形，大小极不一致，最小的仅长 1 厘米，宽 0.5 厘米，最大的长 2—3.5 厘米，宽 1.5 厘米，通常长 2—2.5 厘米，宽 0.7—1 厘米，顶端渐尖，基部楔形，上面散生紧贴短柔毛，下面无毛，边具缘毛；中脉在上面平坦，下面微凸，侧脉每边约 3 条，不明显；叶柄极短，长 1—3 毫米；托叶两侧有数条短刚毛。聚伞花序顶生和腋生，有长 1—2.5 厘米的纤细总花梗；花无梗或具短梗，侧生的长 3—4 毫米，盛开时长 3.5—4 毫米；花萼长 1—1.5 毫米，萼檐裂片与萼管近等长；花冠浅紫色，长 3 毫米，裂片披针形，比冠管短，顶部渐尖；雄蕊生于冠管喉部，花丝极短，花药内藏；子房 2 室，花柱丝形，伸出，柱头 2，线形，被毛。蒴果扁球形，顶部截平，长 1.5—2 毫米，宽 3 毫米，顶部有宿存的萼檐裂片；果柄纤细，线形，长 2—7 毫米；种子 9—10 粒，平凸状，黑褐色，微小，种皮粗糙，具网纹。花期 9—10 月。

产于云南屏边和蒙自等地；生于海拔 1 100—1 700 米的山谷、略为荫蔽的山坡或溪流两岸，颇常见。

2. 臭味新耳草 (新耳草) 图版 16


Neanotis ingrata (Wall. ex Hook. f.) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 39. 1966. — *Anotis ingrata* Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 71. 1880；中国高等植物图鉴 4: 224, 图 5862. 1975.

2a. 臭味新耳草 (原变型)

f. *ingrata*

多年生草本，高 0.7—1 米，全株有臭味；茎有明显的直棱或槽，少分枝或不分枝，直立或下部卧地，无毛或在节上被毛。叶卵状披针形，很少卵形或长椭圆形，长 4—9 厘米，宽 1.4—3.4 厘米，顶端渐尖，基部渐狭，边具缘毛，两面均被疏柔毛，干后常常变黑色；中脉在下面平坦，侧脉纤细，每边 7—9 条，不大明显；托叶顶部分裂为数条刚毛状、长 10—15 毫米的裂片，具缘毛。花序顶生或近顶生，为多歧聚伞花序，有总花梗；花无梗或具短梗，盛开时花萼长 2.5 毫米，萼檐裂片外反，长于萼管，披针形，边具缘毛；花冠白色，长 4—5 毫米，宽 4 毫米，裂片长圆形，顶端钝；雄蕊和花柱均伸出冠管外。蒴果近扁球状，通常无毛，每室有种子数粒；种子小，黑褐色，平凸，有小疣点。花期 6—9 月。

产于江苏、浙江、湖南、湖北、贵州、云南、四川西部、西藏南部等地；生于海拔



图版 15 1—6. 紫花新耳草 *Neanotis calycina* (Wall. ex Hook. f.) Lewis; 1. 植株; 2. 放大的托叶和一小段茎; 3. 花; 4. 花萼; 5. 花冠展开; 6. 花柱和柱头。7—11. 西南新耳草 *Neanotis wightiana* (Wall. ex Wight et Arn.) Lewis; 7. 植株; 8. 放大的托叶和一小段茎; 9. 花; 10. 花冠展开; 11. 花柱和柱头。(余峰绘)