

花期 3—4 月。

产于广东博罗罗浮山、高要和广州郊区；生于山谷溪旁和荒地上，普遍。模式标本采自广东省广州市郊区。

5. 西南新耳草 (新拟) 图版 15: 7—11

Neanotis wightiana (Wall. ex Wight et Arn.) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 40. 1966. —*Hedyotis wightiana* Wall. ex Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. Or. 410. 1834. —*Anotis wightiana* (Wall. ex Wight et Arn.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 75. 1880.

多年生披散草本，除花外全部被污黄色绒毛；茎有明显的直棱和深槽。叶无柄或具极短柄，卵形至披针形，长 7—25 毫米，宽 5—14 毫米，顶端近短尖，基部阔楔形或近圆形，两面叶脉均不明显；侧脉每边约 2 条；托叶短，深齿裂。聚伞花序密集成头状，顶生，无总花梗，通常有两片叶形苞片承托；花无梗或具极短梗，盛开时长 2 毫米，顶部直径 1.5 毫米；花萼长 1 毫米，萼檐裂片齿状；花冠白色，罕有浅红色，长 1.5 毫米，裂片长 0.2 毫米；花药略伸出；花柱内藏。蒴果扁球形，直径 1.5 毫米，室间有深槽，顶部有宿存萼檐裂片，干后粗糙；种子每室 2—4 粒，平凸，深褐色，有光泽。花期 5 月，果期 8 月。

产于云南屏边和广西大苗山；生于海拔 1 000 至 1 500 米处的草坡、路旁或溪流两岸。国外分布于印度。


6. 薄叶新耳草 (新拟)

Neanotis hirsuta (Linn. f.) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 38. 1966. —*Oldenlandia hirsuta* Linn. f. Suppl. Pl. 127. 1781. —*Hedyotis hirsuta* (Linn. f.) J. E. Smith in Rees, Cycl. 17. 1811. —*H. lindleyana* Hook. ex Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. Or. **1**: 409. 1834, nom. subnud. —*Oldenlandia japonica* Miq. in Ann. Mus. Lugd. -Bat.: **3**: 109. 1867. —*Hedyotis stipulata* R. Br. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 63. 1880. —*Anotis hirsuta* (Linn. f.) Boerl. **2**: Fl. Ned. Ind. 126. 1891.

6a. 薄叶新耳草 (原变种)

var. *hirsuta*

匍匐草本，下部常生不定根；茎柔弱，具纵棱。叶卵形或椭圆形，长 2—4 厘米，宽 1—1.5 厘米，顶端短尖，基部下延至叶柄，两面被毛或近无毛；叶柄长 4—5 毫米；托叶膜质，基部合生，宽而短，顶部分裂成刺毛状。花序腋生或顶生，有花 1 至数朵，常聚集成头状，有长 5—10 毫米、纤细、不分枝的总花梗；花白色或浅紫色，近无梗或具极短的花梗；萼管管形，萼檐裂片线状披针形，顶端外反，比萼管略长；花冠漏斗形，长 4—5 毫米，裂片阔披针形，顶端短尖，比冠管短；花柱略伸出，柱头 2 浅裂。蒴果扁球形，直径 2—2.5 毫米，顶部平，宿存萼檐裂片长约 1.2 毫米；种子微小，平



图版 15 1—6. 紫花新耳草 *Neanotis calycina* (Wall. ex Hook. f.) Lewis; 1. 植株; 2. 放大的托叶和一小段茎; 3. 花; 4. 花萼; 5. 花冠展开; 6. 花柱和柱头。7—11. 西南新耳草 *Neanotis wightiana* (Wall. ex Wight et Arn.) Lewis; 7. 植株; 8. 放大的托叶和一小段茎; 9. 花; 10. 花冠展开; 11. 花柱和柱头。(余峰绘)