

凸，有小窝孔。花、果期 7—10 月。

产于广东、云南、江苏、浙江和江西；生于林下或溪旁湿地上。国外分布于印度。

6b. 光萼新耳草 (变种) (新拟)

var. *glabricalycina* (Honda) Lewis in Missouri Bot. Gard. **53**: 38. 1966. —
Oldenlandia hirsuta var. *glabricalycina* Honda in Bot. Mag. Tokyo **53**: 333.
1939. —*Hedyotis lindleyana* Hook. ex Wight et Arn. var. *glabricalycina* (Honda)
Hara in Jour. Jap. **18**: 89. 1942; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 276. 1978.

披散状草本；叶两面无毛，仅叶缘具缘毛；花萼无毛；蒴果陀螺形。

产于台湾北部 (台北和新竹)；生于低海拔潮湿地上。国外分布于中南半岛、印度、日本和朝鲜。

7. 台湾新耳草 (新拟) 凉喉茶 (台湾)

Neanotis formosana (Hayata) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 38.
1966. —*Anotis formosana* Hayata, Ic. Pl. Formos. **9**: 54. 1920. —*Hedyotis*
lindleyana auct. non Hook. ex Wight; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 274. 1978.
pro parte, quoad specim. Taiwan.

草本，下部匍匐，上部渐向上升；茎长 10—30 厘米，无毛，纤细。叶纸质或膜质，卵形或卵状长圆形，长 1—2.6 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端短尖，基部钝或近圆形，边全缘，有稀疏而短的缘毛，上面被硬毛，下面仅脉上被疏短硬毛；叶脉纤弱，不明显；叶柄长 2—3 毫米；托叶宽三角形，长约 3 毫米，宽约 2 毫米，膜质，顶端撕裂，裂片狭窄，锐尖。聚伞花序顶生，罕有侧生，有指状撕裂、长 1—1.5 毫米的苞片；花无毛，两侧的花有长 1—1.5 毫米的花梗，中央的无梗；花萼近杯形，下部稍窄，长 2—2.5 毫米，宽 1—1.5 毫米，萼檐裂片长卵形，长 1.5 毫米，宽约 0.7 毫米，顶端钝；花冠白色，钟形，盛开时长 4—6 毫米，宽 5—6 毫米，裂片长圆状三角形，长 2.5—3 毫米，宽 1.5—2 毫米，有明显的脉纹，顶端钝；雄蕊伸出，花药线形，长 1—1.4 毫米；花柱无毛，长 4 毫米，顶部短 2 裂。蒴果扁球形，膜质，长约 2 毫米，直径约 3 毫米，顶部平，有长 1—2 毫米的宿存萼檐裂片；种子微小。花期 4 月，果期 6 月。

产于台湾台北、宜兰和花莲等地；生于中海拔地区的山边。国外分布于日本和马来西亚。模式标本采自台湾北部。

据李惠林主编的《台湾植物志》记载，本种亦产于我国大陆，但具体地点不详。

8. 广东新耳草 (新拟) 图版 17: 5—9

Neanotis kwangtungensis (Merr. et Metcalf) Lewis in Ann. Missouri Bot. Gard. **53**: 39. 1966. —*Anotis kwangtungensis* Merr. et Metcalf in Lingnan Sci. Jour. **16**: 122. 1937.

匍匐草本；茎无毛，具棱，常在下部的节上生根。叶椭圆形，长 4—6.5 厘米，宽