

5, 狭披针形, 长1.7—2毫米, 里面基部二侧有粘液毛; 花冠深红色, 管状高脚碟形, 管纤细, 长1.5—1.8厘米, 外面无毛或被粉状短柔毛, 里面在雄蕊之上被一环白色长毛, 裂片5, 阔卵状近圆形, 长4.5—6毫米, 近无毛; 雄蕊5, 着生在花冠管的近基部, 花丝极短, 花药线形, 长约3毫米; 子房2室, 每室有胚珠多颗, 花柱丝状, 长1.1厘米或稍过之, 柱头棒状, 长约2毫米; 短柱花: 花萼和花冠外形同长柱花; 冠管里面散生白色柔毛; 雄蕊生管的中部, 花药长2.5毫米; 花柱长2毫米, 柱头长1毫米。蒴果近球形, 径4.5—5.5毫米, 成熟时室背开裂为2果瓣, 果瓣复2裂, 裂片顶端具长约2毫米的宿萼裂片; 种子多数, 小而有角。 花期8月。

我国特有, 产于广西龙州武联乡; 生于密林下的岩石上。

8. 紫花螺序草 (植物研究)

Spiradiclis purpureocaerulea Lo in Bull. Bot. Res. 6 (4): 39. 1986.

草本; 枝和小枝均粗壮, 圆柱状, 密被褐色柔毛。叶纸质, 卵形, 长3—6.5厘米, 宽1.5—3厘米, 顶端钝, 基部近圆或阔楔尖, 干时上面变黑色, 密被糙毛状短硬毛, 下面苍白, 密被柔毛; 中脉粗壮, 每边有7—10条侧脉, 均在下面凸起, 网状小脉不明显; 叶柄短或近无柄; 托叶钻状, 长2—3毫米, 尾尖, 被柔毛。聚伞花序顶生, 稠密而多花, 长1.5—3厘米, 总花梗短; 花芽棒状, 密被柔毛, 萼管倒圆锥状球形, 长约2毫米, 被柔毛, 裂片5, 狭披针形, 长4—4.5毫米, 渐尖, 密被柔毛; 花冠蓝紫色, 高脚碟形, 长2.5—2.7厘米, 冠管纤细, 中部稍膨大, 裂片5, 近卵形, 长约6毫米, 钝头; 雄蕊5, 着生在冠管的中部, 花丝短, 花药线状长圆形, 长约5毫米, 基部稍叉开; 花盘环状; 子房2室, 每室有多数胚珠, 花柱短, 长约1.3毫米, 柱头2裂, 裂片狭披针形, 长约1.8毫米。蒴果近球形, 径4—4.5毫米, 被柔毛, 成熟时室背开裂为2果瓣, 果瓣复2裂; 种子多数, 小而有角。 花期8月。

我国特有, 产于广西龙州上金; 生于路边岩石上。

9. 红叶螺序草 (植物研究)

Spiradiclis rubescens Lo in Guihaia 11 (2): 101. 1991.

矮小草本, 高约6厘米; 茎近圆柱状, 近无毛, 干时紫黑色。叶纸质, 长圆形或长圆状卵形, 长4—6厘米, 宽2—2.3厘米, 顶端短尖, 钝头, 基部阔楔尖或钝, 紫红色, 两面无毛, 但有长缘毛; 侧脉每边9—11条, 两面稍凸起; 托叶三角状阔卵形, 长4—5毫米, 尾状渐尖。花序顶生, 有花3—5朵; 花梗短; 小苞片线形, 长4—6毫米, 被疏而长的缘毛; 萼管倒卵形, 长2毫米, 无毛, 裂片5, 狭披针形, 不等长, 大的长4—4.5毫米, 小的长约3.5毫米, 渐尖, 被缘毛, 裂片间有腺体; 花冠红色, 高脚碟状漏斗形, 长约2.4厘米, 冠管外面无毛, 宽约1.5毫米, 裂片5, 卵圆形, 长约3.5毫米; 雄蕊5, 生冠管中部之下, 花丝长1.7毫米, 花药线形, 长2.5毫米; 花柱长1.5毫米, 柱头2裂, 裂片薄, 披针形, 长约1.5毫米。果未见。 花期6月。