

基部楔形，边全缘，两面无毛；侧脉每边 9—12 条，纤细，弧状斜升；叶柄长 3—5 厘米；托叶长三角形，长约 8 毫米，宽约 3 毫米，顶端 2 裂，裂片长约 3 毫米。花序顶生，圆锥花序状，多花，长达 20 厘米，总梗长 9—11 厘米；苞片线形，长 3 毫米；短柱花：萼管卵形，长约 2 毫米；花冠白色，管长约 5 毫米，外面无毛，有条纹，里面喉部被须毛；雄蕊 5，着生于花冠喉部；花柱长 2 毫米，柱头 2，棒状。长柱花未见。蒴果卵形，长 2 毫米，无毛。 花、果期 4—6 月。

我国特有，产于广西崇左和大新；生于丛林下岩石上。模式标本采自广西崇左侏泥。

亚属 2. 螺序草亚属 Subgen. *Spiradiclis*

蒴果椭圆形或线状长圆形，长为宽的 2—4 倍；果瓣多少扭曲。

8—9 种，分布于亚洲东南部及我国南部和西南部。我国有 7 种，产于广西、云南、贵州、四川和西藏。

24. 滇南螺序草 (广西植物)

Spiradiclis malipoensis Lo in Guihaia 11 (2): 98. 1991.

草本，高 20—25 厘米；茎基部卧地生根，上部直立，不分枝，较纤细，被 2 列很密的短硬毛。叶纸质，披针状长圆形或卵状椭圆形，长 4.5—8 厘米，宽 1.5—3.5 厘米，顶端渐尖，钝头，基部楔尖至阔楔尖，稍下延，干时榄绿色，两面无毛；中脉在下面压扁，侧脉每边 10—11 条，弧状，末端近叶缘连成边脉；叶柄长 0.5—1 厘米；托叶披针状线形或线形，长 5—8 毫米，渐尖。花序和花均未见。果序顶生，长 2.5—3 厘米，近无毛，总梗长约 1 厘米，果梗长 3—4 毫米；蒴果近椭圆形，长 5.5—6 毫米，有纵棱，成熟时白色，开裂为 4 瓣，果瓣稍扭曲；种子未见。 果期 11—12 月。

我国特有，产于云南麻栗坡黄金印；生于海拔 1 100 米处的密林中。

25. 龙州螺序草 (广西植物)

Spiradiclis longzhouensis Lo in Guihaia 11 (2): 99. 1991.

灌木状草本 (据采集者记载为乔木?)；小枝粗壮，径 5—6 毫米，节间长 0.5—1 厘米。叶簇生小枝上部，纸质，椭圆形或有时长圆形，长 15—21 厘米，宽 4—8.5 厘米，顶端骤尖，基部通常下延，干时榄绿色，下面较苍白，两面无毛；中脉较阔，上面凹下成浅沟状，下面压扁，有纵条纹，侧脉每边 16—23 条，斜升，略呈弯弧状，压扁；叶柄长 3—4.5 厘米，干时变黑色；托叶近卵形，长约 1 厘米，具直出平行脉。花序和花均未见。果序顶生，长 15 厘米，疏散；小苞片线形，长 3—5 毫米；果梗纤细，长 5—10 毫米；果椭圆形，长约 3.5 毫米，宽约 1.7 毫米，宿萼裂片线形，长 2—2.5 毫米；种子多颗，小而有棱角。 果期 4 月。

我国特有。产于广西龙州板闭；生于密林中岩石上。