

8—9 毫米，基部宽约 1.7 毫米，内外均无毛，裂片 5，近卵形，长约 1 毫米，背面无明显的直棱，亦无附属体；雄蕊 5，生冠管近中部，花丝长 1.5—2 毫米，花药线形，长 2—2.8 毫米，不伸出；花柱长 7—7.5 毫米，近无毛，柱头 2 裂，裂片薄，卵状椭圆形，长约 1.5 毫米，略高于花药；花盘 2 裂。蒴果阔僧帽状，高约 3 毫米，宽约 8 毫米，近无毛或被粉状短柔毛。花期 10—12 月。

产于云南贡山、福贡、蒙自、屏边、马关和西藏墨脱等地；生于海拔 1 300—2 100 米处的阔叶林下。国外分布于锡金、印度东北部（阿萨姆）、缅甸、泰国（清迈）。

据《印度支那植物志》(Fl. Gen. Indo-Chine 3: 157. 1923) 及《西藏植物志》记载，本种花萼、花冠和雄蕊均为 4 数，编者检查过的云南标本则均为 5 数，又 B. Verdcourt 博士函告，本种模式标本的花均为 5 数，因此上述文献记载的是否确是本种，尚待证实。

25. 小花蛇根草 (台湾植物志)

Ophiorrhiza liukuensis Hayata, Ic. Pl. Formos. 2: 89. 1912; Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. 7: 196. 1938; Chao in Li, Fl. Taiwan 4: 322, pl. 1024. 1978; Lo in Bull. Bot. Res. 10 (2): 34. 1990. —*O. parviflora* Hayata l. c. 90, non Reinw. ex Korth. (1851). —*O. kotoensis* Hatusima in Journ. Jap. Bot. 14: 239. 1938. —*O. kuroiwai* Makino in Bot. Mag. Tokyo 20: 5. 1906. nom. nud.

草本，高约 60 厘米，茎有四棱，被极短柔毛。叶膜质，长圆状卵形，长 8—15 厘米，宽 3.5—6 厘米，顶端短尖，钝尖，基部楔状渐狭，上面微粗糙，下面脉上有毛，干时变红色或苍白，全缘，初时有小缘毛；叶柄长 2—3 厘米；托叶 2 深裂，裂片骤尖或丝状，长达 2—3 毫米，被短柔毛。花序顶生，总梗长 4—5 厘米，聚伞状分枝，分枝被柔毛，呈螺状；花多而密集，花梗极短或长 2 毫米，无小苞片；萼管坛状，长 1—1.5 毫米，裂片 5，三角形，长 0.3—0.5 毫米，背部有龙骨；花冠钟状，长 3.5—4.5 毫米，外面被短柔毛，冠管里面中部以下无毛，喉部被白色长毛，裂片 5，卵状三角形，里面有微小瘤体；雄蕊 5，着生在冠管基部，花丝长 1.5 毫米，花药长圆形，长 1—1.25 毫米，两端微凹；花柱长 3.5 毫米，柱头 2 裂，裂片扁而圆。蒴果宽 9 毫米，长 3—3.5 毫米，有 5 棱，基部极钝，顶截平或微凹，冠以高凸的宿存花盘，被短柔毛；种子锯屑状，有角，角上有锐棱，有极小的网纹。

产于台湾兰屿和烂头岛。国外分布于日本和菲律宾。

26. 金黄蛇根草 (植物研究)

Ophiorrhiza aureolina Lo in Bull. Bot. Res. 10 (2): 34. 1990.

26a. 金黄蛇根草 (原变型)

f. *aureolina*

草本，直立或基部卧地生根，高 10—30 厘米，有时可达 45 厘米；茎和分枝圆柱状