

米，密被棕红色长柔毛；托叶脱落未见。花序顶生，总梗长约1厘米，被棕红色长柔毛，花4—8朵，密集于总梗末端；花梗很短；小苞片长圆形，长3.5—6毫米，被缘毛；萼管陀螺状，有10棱，长约2毫米，近无毛，裂片5，三角形，长约0.5毫米，钝头；花冠白色，近管状漏斗形，外面无毛，里面中部被一环长柔毛，管长1.1—1.2厘米，裂片三角形，长约2.2毫米，顶端内折，背面有狭翅，近顶部有角状附属体；雄蕊5，生管之近中部，花丝极短，花药线形，长约2.5毫米；花盘2裂；花柱丝状，密被毛，长约9.5毫米，柱头长椭圆形，稍薄，长约2.5毫米。果未见。花期4月。

我国特有，产于广西那坡德隆；生于林下。

50. 腺木叶蛇根草 (广西植物)

Ophiorrhiza mycetiifolia Lo in Guihaia **11** (2): 103. 1991.

草本或灌木状，高2.5米；小枝有条纹，被短柔毛。叶薄纸质，椭圆状卵形或椭圆形，长10—20厘米，宽4—7.5厘米，顶端骤尖，基部阔楔尖，略下延，干时榄绿色，两面无毛或上面散生短糙伏毛；中脉在上面压入，下面压扁，网脉下面明显；叶柄压扁，长2—4厘米，密被柔毛；托叶脱落，未见。花序顶生，稠密多花，径5—6厘米；小苞片线状披针形，长5—10毫米，渐尖，被流苏状缘毛；花梗长1—2毫米，或近无梗；萼管扁陀螺状，宽4毫米，被硬毛，有5棱，裂片5，三角形，长1毫米；花冠白色，管状，管长10—11毫米，基部宽2.5—3毫米，外面无毛，里面被柔毛，裂片5，近三角形，长约2毫米，盛开时反折，背面近顶部有一长1.5—2毫米的角状附属体，里面被柔毛；雄蕊5，伸至冠管中部；花盘杯状，2裂；子房2室，胚珠多数，花柱伸至管口。果未见。花期12月。

我国特有，产于广西龙州板闭；生于山谷疏林中。

51. 长角蛇根草 (植物研究) 图版 39: 1—6

Ophiorrhiza longicornis Lo in Bull. Bot. Res. **10** (2): 57, fig. 19. 1990.

草本，除花序外无毛；枝圆柱状，干时褐红色。叶纸质，稍厚，长椭圆状卵形，长4—10厘米，宽1.5—3.5厘米，顶端骤尖或呈尾状，钝头，基部楔形，全缘，两面无毛，下面干时带黄色或绿黄色；侧脉每边7—11条，上面不很明显，下面干时变褐色，且有光泽；叶柄长1—2厘米；托叶脱落，未见。花序顶生，呈伞房状，多花，总梗长1.5—2.5厘米，分枝长约1厘米，均被微柔毛；花梗极短，被微柔毛；小苞片线状披针形，稍肉质，长3—5毫米，锐尖，干时常变紫色；萼管扁球状陀螺形，长约1.5毫米，宽约2.5毫米，5或10棱，被微柔毛，裂片5，三角形，长0.7—1毫米，近无毛，裂片间有1腺体；花冠未开放紫红色，管状，外面无毛，冠管长约4.5毫米，基部宽约1.8毫米，外面有5条狭棱，里面中部之下有一圈白色柔毛；裂片小，近三角形，长0.4—0.5毫米，顶端内弯，喙状，背部有一长1.5—2毫米的角状附属体，干时变紫蓝色；雄蕊5，生冠管之喉部，花丝极短，花药狭长圆形，长约2毫米，伸至管口；花柱