

约 120 种，产于美洲的热带地区。我国引入栽培 1 种，见于广州和香港。

本属模式种：Rondeletia americana Linn.

1. 郎德木 (广州植物志) 图版 47

Rondeletia odorata Jacq. Enum. Pl. Carib. 16. 1760; Jacq. ex Matsum. Ind. Pl. Jap. 2 (2): 595. 1912; Bailey, Man. Cult. Pl. 932. 1949; 广州植物志 500. 1956; Backer et Bakh. Fl. Java 2: 294. 1965.

灌木，高可达 2 米；枝被柔毛或无毛，嫩枝被棕黄色硬毛。叶对生，革质，具短柄，粗糙，卵形、椭圆形或长圆形，长 2—5 厘米，宽 1—3.5 厘米，顶端钝或短尖，基部钝或近心形，边缘背卷，叶两面常皱，下面被疏柔毛，上面布满小凸点，常在小凸点上有短硬毛；侧脉 3—6 对，在下面凸起，上面凹下；叶柄长 1—2 毫米；托叶三角形，长 4—5 毫米，有柔毛，顶端尖。聚伞花序顶生，有花数朵至多朵，长约 3 厘米，宽 3—4.5 厘米，被棕黄色柔毛；花直径约 1 厘米，有花梗；萼管近球形，长约 6.5 毫米，密被硬毛，裂片 5，线形，长 4—5 毫米，有疏柔毛；花冠鲜红色，喉部带黄色，外面有短柔毛，冠管柔弱，长约 1 厘米，裂片近圆形，长约 3.5 毫米，宽约 4 毫米；花药长约 2.75 毫米。蒴果球形，密被柔毛，直径 3—4 毫米。花期 7—9 月。

广州和香港有栽培。原产于古巴、巴拿马、墨西哥等地。


为一美丽的庭园观赏植物。

16. 水锦树属 *Wendlandia* Bartl. ex DC. nom. cons.

Bartl. ex DC. Prodr. 4: 411. 1830; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gén. Pl. 2: 50. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV(4):37. 1891; Cowan in Not. Roy. Bot. Card. Edinb. 16: 233. 1932.

灌木或乔木。单叶对生，很少 3 枚轮生，具柄或近无柄；托叶生叶柄间，三角形或近三角形，顶端尖或上部扩大常呈圆形而反折，极少不反折，脱落或宿存。花小，无花梗或具花梗，聚伞花序排列成顶生、稠密、多花的圆锥花序式，有苞片和小苞片；萼管通常为近球形、卵形或陀螺形，萼檐 5 裂，裂片宿存；花冠管状、高脚碟状或漏斗状，冠管喉部无毛、被柔毛或硬毛，顶部 5 裂，罕为 4 裂，裂片扩展或外反，覆瓦状排列；雄蕊 5 (—4)，着生在花冠裂片间，伸出或稍内藏；花盘环状；子房 2 (—3) 室，每室有胚珠多数，花柱纤细，柱头 2 裂、很少不裂而呈棒槌状。蒴果小，球形，脆壳质，室背开裂，罕室内开裂为 2 果片；种子扁，种皮膜质，有网纹，有时有狭翅，胚乳肉质。

约 90 种，绝大多数分布在亚洲的热带和亚热带地区，仅极少数分布在大洋洲。我



图版 47 郎德木 *Rondeletia odorata* Jacq.: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠展开, 示雄蕊、雌蕊和子房纵切面;
4. 雄蕊腹面; 5. 雄蕊背面。(黄少容绘)