

Phytotax. Sinica **21** (3): 283. 1983.

本亚种与原亚种不同的是叶侧脉 7—10 对，较密，常在叶下面凸起；花冠长 3—5 毫米，花冠管稍长于花冠裂片。花期 4—7 月，果期 5—12 月。

产于广西西部和南部，云南东南部；生于海拔 260—1 600 米的丘陵或山地的灌丛和林中。国外分布于越南。模式标本采自广西上思十万大山那凡村。

4. 广西水锦树 (广西植物名录) 图版 48: 1—3

Wendlandia aberrans How in Sunyatsenia **7** (1—2): 44, fig. 1. 1948; 中国高等植物图鉴 **4**: 205, 图 5823. 1975; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (3): 283. 1983.


灌木，高 1—3 米；枝圆柱形，黄褐色，小枝密被紧贴的铁锈色硬毛。叶纸质，长圆状椭圆形或卵状椭圆形，长 5—16 厘米，宽 2—5.8 厘米，顶端短尾状渐尖或短尖，基部楔尖或短尖，干时赤黄色，上面散生紧贴的短硬毛，在中脉上较密，下面散生短硬毛，在脉上较密；中脉在上面平坦，在下面凸起；侧脉 6—12 对，纤细，弯，在下面明显；叶柄长 3—10 毫米，有黄褐色小硬毛；托叶三角形，顶端长尖，长 3—5 毫米，有黄褐色小硬毛，后渐无毛，脱落。圆锥状聚伞花序顶生，长 5—10 厘米，宽 3—8 厘米，有紧贴的铁锈色硬毛；苞片叶状或丝状，有短柔毛；小苞片丝状，有短柔毛；花梗短，有柔毛；花萼被灰白色硬毛，长 1.5—2.5 毫米，萼管近球形，裂片披针形，稍短于萼管；花冠漏斗形，白带红色，向上稍扩大，长 1—1.3 厘米，外面无毛，内面中部有白色疏长柔毛，裂片长圆状卵形，顶端钝或微缺，长 1.5—2 毫米；花药线状长圆形，长 1—1.7 毫米；花柱纤细，与花冠近等长，无毛，柱头 2 裂，稍伸出。果未见。花期 4—12 月。

产于广西那坡；生于海拔 900—1 200 米的山坡林中。模式标本采自广西那坡县德窝乡冷头山。

5. 长梗水锦树 (植物分类学报)

Wendlandia longipedicellata How in Sunyatsenia **7** (1—2): 39, pl. 6. 1948; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (3): 283. 1983; 云南种子植物名录，下册：1276. 1984, excl. 李鸣岗 1675.

灌木，高约 1.5 米；小枝有铁锈色短柔毛。叶革质，椭圆形或披针状椭圆形，长 4—8 厘米，宽 0.8—2 厘米，两端渐狭，基部常下延，上面无毛，下面仅在中脉上有极疏的短柔毛；侧脉在两面均不明显；叶柄长 0.5—1 厘米，无毛或有疏短柔毛；托叶阔三角形，长 1.5 毫米，顶端短尖。花序顶生，疏花，广展，有铁锈色柔毛；花梗长 3—6 毫米，有疏短柔毛或无毛；花萼长 1.75 毫米，有疏短柔毛或无毛，萼裂片三角形，长 0.75 毫米；花冠紫红色，管状，长 4—4.5 毫米，裂片长圆形，长 1.7 毫米，外面有极疏的短柔毛，开放时下弯；花药线状披针形，长 1.2 毫米，伸出；花柱伸出，常有疏柔



图版 48 1—3. 广西水锦树 *Wendlandia aberrans* How: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠展开, 示雄蕊。4—7. 柳叶水锦树 *Wendlandia salicifolia* Franch. ex Drake: 4. 果枝; 5. 花; 6. 花冠展开, 示雄蕊; 7. 果。8—11. 短花水金京 *Wendlandia formosana* Cowan subsp. *breviflora* How: 8. 果枝; 9. 花; 10. 花冠展开, 示雄蕊; 11. 果。(余峰绘)