

毛，柱头 2 裂。果未见。 花期 2 月。

产于云南潞西；生于海拔 1 550 米的山地林中。模式标本采于云南潞西。

亚系 2. 圆托叶亚系 Subser. Orbiculares Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 248. 1932.

托叶上部扩大常呈圆形，反折。

我国有 2 种。

6. 美丽水锦树 (西藏植物名录) 图版 49: 1—4

Wendlandia speciosa Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 254. 1932 et **18**: 184. 1934; How in Sunyatsenia **7** (1—2): 41. 1948; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (3): 284. 1983; 云南种子植物名录, 下册: 1277. 1984; 西藏植物志 **4**: 430. 1985. ——*W. speciosa* Cowan var. *forrestii* Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 255, pl. 233. fig. 4. 1932 et **18**: 184. 1934; How in Sunyatsenia **7** (1—2): 41. 1948.


灌木或乔木，高 1—12 米；小枝有褐黄色短柔毛。叶纸质或革质，卵形、倒卵形、卵状披针形或椭圆形，长 6—19 厘米，宽 2.5—11 厘米，顶端短尖或渐尖，基部短尖或楔形，两面脉上有疏短柔毛或近无毛，其余部分无毛或有极疏的短柔毛；侧脉 5—12 对，在下面凸起；叶柄长 0.5—3 厘米，有短柔毛或无毛；托叶长约 4 毫米，上部扩大，圆形，反折。花序顶生，开展，大，长可达 30 厘米，宽可达 23 厘米，被棕黄色柔毛；苞片线形；花香，具短花梗；花萼长 2.5—3 毫米，萼管被黄褐色柔毛，至上部渐疏，萼裂片披针形，被疏柔毛，长 1.5 毫米，与萼管等长或稍较长；花冠白色、黄白色或红色，管状，长约 1 厘米，外面无毛，冠管内面被白色长柔毛，裂片狭长圆形，长 2.5 毫米，开放时外反；花药线状披针形，伸出，长 2 毫米，基部 2 裂，花丝长 1.5 毫米；花柱有白色长柔毛，柱头 2 裂，伸出花冠之上达 3.5 毫米。果球形，有短柔毛，直径 2.5—3 毫米，顶冠以宿存萼裂片。 花、果期 3—11 月。

产于云南腾冲、福贡，西藏墨脱；生于山坡、山谷溪边的林中或林缘，海拔 1 500—2 800 米。国外分布于缅甸和不丹。模式标本采自云南腾冲。

7. 薄叶水锦树 (植物分类学报) 红花水锦树 (云南种子植物名录) 图版 49: 5—9

Wendlandia bouvardioides Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 393. 1916; Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 303. 1932; How in Sunyatsenia **7** (1—2): 53. 1948; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (3): 284. 1983; 云南种子植物名录, 下册: 1276. 1984.

灌木或小乔木，高 1—5 米；小枝有棕黄色紧贴的硬毛。叶薄纸质，干时黑褐色，



图版 49 1—4. 美丽水锦树 *Wendlandia speciosa* Cowan: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠展开, 示雄蕊; 4. 花柱和柱头。5—9. 薄叶水锦树 *W. bouvardioides* Hutchins.: 5. 花枝; 6. 花; 7. 花冠展开, 示雄蕊; 8. 花柱和柱头; 9. 果。(余峰绘)