

## 21. 景东水锦树 (植物分类学报)

*Wendlandia jingdongensis* W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (4): 396, pl. 1; 3. 1983.

灌木, 高约 3 米; 小枝被柔毛。叶革质, 披针状椭圆形, 长 7—10.5 厘米, 宽 2—4 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形或稍短尖, 上面无毛或仅在脉上有疏的微柔毛, 下面在脉上有疏短柔毛; 侧脉 7—8 对, 在下面明显; 叶柄长 0.7—1 厘米, 有短柔毛; 托叶上部扩大; 圆形, 不反折, 与小枝等宽或较宽。花序顶生, 长 9—15 厘米, 宽 10—15 厘米, 密被褐色硬毛; 花无花梗, 密生; 花萼长约 1.5 毫米, 被柔毛, 裂片披针形, 与萼管等长; 花冠淡黄色, 长 3—3.5 毫米, 外面无毛, 冠管内有白色硬毛, 裂片长约 0.5 毫米; 花药椭圆形, 长 0.6 毫米, 花丝很短; 柱头 2 裂。蒴果球形, 直径约 1.5 毫米, 密被短柔毛, 无果柄。 花、果期 5 月。

产于云南景东; 生于海拔 1 650 米的山地林中。模式标本采自云南景东县温卜鸡跳河。

## 22. 思茅水锦树 (植物分类学报)

*Wendlandia augustinii* Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 298, pl. 235. fig. 6. 1932; How in Sunyatsenia **7** (1—2): 56. 1948; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (4): 397. 1983; 云南种子植物名录, 下册: 1276. 1984.

灌木, 高 2—3 米; 小枝纤细, 有褐色柔毛。叶纸质, 椭圆形或椭圆状卵形, 长达 13 厘米, 宽 4 厘米, 顶端稍渐尖, 基部楔形, 上面有微弯的白色刚毛和短硬毛, 后变无毛, 下面有较弯曲的柔毛; 侧脉 8—9 对; 叶柄长 5—10 毫米; 托叶革质, 宿存, 中部收缩, 顶端圆形, 宽 3—4 毫米, 有疏硬毛。花序顶生, 密被柔毛, 长不过 12 厘米; 苞片线形, 有柔毛; 花无梗, 或有时具短花梗; 花萼长约 1 毫米, 有疏柔毛, 裂片三角形, 长约 0.3 毫米; 花冠淡白色, 冠管管状, 在上部稍扩大, 无毛, 长 5 毫米, 裂片卵形, 长 0.6—0.8 毫米; 花药椭圆形, 花丝很短; 柱头 2 裂, 稍伸出。果未见。

产于云南思茅; 生于海拔 1 270 米的山地林中。模式标本采自云南思茅。

## 23. 吕宋水锦树 (台湾植物志)

*Wendlandia luzoniensis* DC. Prodr. **4**: 412. 1830; Cowan in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **16**: 294, pl. 235. fig. 9. 1932; Kanehira, Formos. Trees ed. 2. 690, fig. 645. 1936; How in Sunyatsenia **7** (1—2): 56. 1948; Li, Woody Fl. Taiwan 882. 1963; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 346. 1978; W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **21** (4): 397. 1983. — *W. multiflora* Bartl. ex DC. Prodr. **4**: 412. 1830. — *W. membranifolia* Elmer, Leaflets Philip. Bot. **1**: 375. 1908.

灌木或小乔木, 小枝散生柔毛或近无毛。叶纸质, 卵状长圆形或椭圆形, 长 10—20 厘米, 宽 4.5—7 厘米, 顶端短渐尖, 基部楔形, 两面无毛; 侧脉 8—9 对, 在下面凸