

卵形，长约1.2毫米；花药椭圆形，长约0.8毫米，花丝很短；花柱伸出，柱头2裂。果未见。花期4—10月。

产于台湾；生于低海拔的山地林中。模式标本采自台湾，具体地点不详。

26. 密花水锦树 (广西植物名录)

Wendlandia myriantha How in *Sunyatsenia* 7 (1—2): 57, pl. 9. 1948; W. C. Chen in *Acta Phytotax. Sinica* 21 (4): 399. 1983.

灌木，高约3米；枝被短的棕褐色柔毛。叶近革质，椭圆形，长7—12厘米，宽2.5—6厘米，顶端短渐尖，基部楔尖，边缘有稀疏的细缘毛，上面无毛或散生极稀疏的短柔毛，在中脉上有粉状短柔毛，下面散生短柔毛；侧脉8—10对，在下面凸起；叶柄长7—12毫米，有短柔毛；托叶反折，卵圆形，有疏而小的短柔毛，顶部常2裂或裂成2小裂片。圆锥状的聚伞花序顶生，广展，长和宽均约20厘米，被棕褐色短柔毛；苞片在下部的叶状，在上部的较小，线状披针形或倒披针形，长3—6毫米，被紧贴的短柔毛；小苞片长圆形或长圆状披针形，比花萼稍短；花无花梗，簇生；花萼近球形，无毛或罕有极疏的短柔毛，长约2毫米，裂片卵形或卵状三角形，与萼管近等长；花冠管状，白色，在上部稍扩大，长约5毫米，外面无毛，在喉部有白色硬毛，裂片卵形，长约1厘米；花药椭圆形，长约1毫米，花丝很短；花柱无毛，柱头2裂，伸出。果未见。花期3月。

产于广西上思；生于海拔250米的山谷溪边林中。模式标本采自广西上思县十万大山。

27. 龙州水锦树 (植物分类学报) 图版52: 1—4

Wendlandia oligantha W. C. Chen in *Acta Phytotax. Sinica* 21 (4): 399, fig. 9. 1983.

灌木或乔木，高3—10米；小枝灰褐色，无毛或有疏短柔毛。叶革质，椭圆形、卵形或卵状长圆形，长3—10.5厘米，宽1.5—5厘米，顶端短尖或短渐尖，基部楔形或短尖，两面无毛或有时在中脉上有疏短柔毛，干时上面呈黑褐色；侧脉5—7对，纤细，在下面稍明显；叶柄长3—15毫米，无毛或有粉状柔毛；托叶顶端圆形，反折，与枝近等宽，常脱落。花序顶生，被柔毛，长7—18厘米，宽4—15厘米，疏花；花有短花梗或无梗；花萼近球形，长1.5毫米，无毛，裂片三角形，长0.5毫米；花冠高脚碟状，白色，长约4.5毫米，外面无毛，喉部有白色柔毛，裂片卵形，长1毫米，开放时反折，花药椭圆形，长约0.7毫米，花丝很短；柱头2裂，伸出。蒴果球形，无毛，直径约1.5毫米，顶端有宿存的萼裂片。花期7—8月，果期8—12月。

产于广西龙州、靖西；生于海拔300—940米的山谷林中或灌丛，常长在岩石上。模式标本采自广西龙州县武联乡板闭村炮台山。