

木材褐色，供制家具、农具、火柴杆、乐器等。树皮纤维可制麻袋、绳索及人造棉等。

32. 槁裂木属 *Pertusadina* Ridsd.

Ridsd. in Blumea 24 (2): 353. 1978.

乔木或灌木；树干常有纵沟槽；顶芽圆锥形。叶对生；托叶窄三角形，有时顶部二裂，跨褶，脱落。头状花序腋生，稀为顶生，花序梗单生或3条，不分枝或二歧聚伞状分枝，稀为圆锥花序状，节上的托叶小，苞片状，不包裹幼龄头状花序。花5数，近无梗，小苞片匙形至线状匙形；花萼管相互分离，萼裂片钝，三角状至椭圆状长圆形，宿存；花冠高脚碟状至窄漏斗形，花冠裂片在芽内镊合状，但顶部近覆瓦状；雄蕊着生于花冠管的上部，花丝短，无毛，花药基着，内向，伸出冠喉外；花柱伸长，柱头球形至倒卵球形，子房2室，胎座位于隔膜上部1/3处，每室有悬垂胚珠达10颗。果序的小蒴果疏松；小蒴果有硬的内果皮，室背室间4爿开裂，宿存萼裂片留附在蒴果中轴上。种子卵圆状三角形，两侧略压扁，略具翅。

本属有4种，国外分布于马来半岛、新几内亚和菲律宾。我国有1种。

本属模式种：*Pertusadina eurhyncha* (Miq.) Ridsd.

1. 海南槁裂木 (新拟) 海南水团花 (海南植物志) 图版72

Pertusadina hainanensis (How) Ridsd. in Blumea 24 (2): 354. 1978; 徐祥浩等, 华南农学院学报2 (4): 36. 1918. ——*Adina hainanensis* How in Sunyatsenia 6: 240, fig. 29. 1946; 海南植物志3: 289. 1974; 中国高等植物图鉴4: 185. 图5784. 1975. ——*A. affines* How, 1. c. 239. fig. 28. ——*A. polycephala* Benth. var. *glabra* How, 1. c. 246. ——*A. pubicostata* auct. non Merr.: How, 1. c. 246; 海南植物志3: 289. 1974. ——*A. metcalfii* Merr. ex Li in Journ. Arn. Arb. 24 (4): 454. 1943.

乔木或灌木，高达30米；幼枝栗色，无毛或近无毛。叶厚纸质，椭圆形至椭圆状长圆形，长4—10厘米，宽2—3厘米，顶端渐尖，基部楔形，两面无毛或被短柔毛；侧脉7—10对，下面无毛，脉腋窝陷内无毛或有稀疏的毛，网脉不明显；叶柄长3—10毫米，无毛或被短柔毛；托叶线状长圆形至钻形，全缘，稀顶端有凹缺，无毛。头状花序不计花冠直径6—8毫米，花序梗单一，不分枝，或有时二歧状分枝；小苞片线状棒形至线状匙形，顶端具缘毛；花萼管长0.5—0.7毫米，无毛或有稀疏的毛，基部通常有长毛，萼裂片线状长圆形，长1.5—2毫米，内外均有稀疏的毛；花冠黄色，芳香，高脚碟状，花冠管的内外均无毛，花冠裂片三角形；花柱伸出，柱头倒卵圆形。果序直径4—6毫米；小蒴果长1.5—2.5毫米，被稀疏的短柔毛。花期6—7月。