

1/5 处，花药长 5—6 毫米，花丝无毛；花柱长 8 毫米，无毛，柱头 2 裂。浆果卵形，长 8—9 毫米，直径 6—7 毫米，无毛。花期 5 月。

我国特有，产于广西；生于疏灌丛中。模式标本采自广西大青山。

24. 贡山玉叶金花 (云南种子植物名录)

Mussaenda treutleri Stapf in Curtis's Bot. Mag. **5**: 135, t. 8254. 1909; Jayaweera in Journ. Arn. Arb. **44**: 247. 1963; Yamazaki in Hara, Fl. E. Himal. 312. 1966; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 205. 1979; 云南种子植物名录, 下册: 1264. 1984; Hsue et H. Wu in Acta Phytotax. Sinica **24** (3): 239. 1986.

直立灌木；嫩枝被短柔毛。叶对生，纸质，卵形或卵状椭圆形，长 13—30 厘米，宽 7—15 厘米，顶端短渐尖，基部通常短截形；两面疏被粗毛，脉上有长硬毛，在下面及中脉上的毛较密；叶柄长 1.5—4 厘米；托叶宽卵形或三角状，渐尖，常 2 裂，长 1—1.2 厘米，宽 6 毫米，密被长柔毛。聚伞花序顶生和生于上部叶腋，多花而稠密；下部的苞片较宽，上部的苞片线形；花梗很短；花萼管钟形，长 3 毫米，被长柔毛，萼裂片线形，长 7—10 毫米，被长柔毛；花叶白色，卵圆形，长 6.5—8 厘米，宽 4—5 厘米，有纵脉 7 条，顶端短渐尖，基部阔楔形，两面被长柔毛；花冠管长 2—3 厘米，外面密被贴伏柔毛，喉部内面密被橙红色棒状毛，花冠裂片橙红色，卵形，长 6 毫米，尾状渐尖，内面密生小疣突。浆果球形，直径 1—1.2 厘米，成熟时无毛。花期 7—9 月。

产于云南大理和河口；常生密林中湿土上。国外分布于印度东北部卡西山。

25. 广西玉叶金花 (中国高等植物图鉴)

Mussaenda kwangsiensis Li in Journ. Arn. Arb. **24** (4): 455. 1943; 中国高等植物图鉴 **4**: 197, 图 5808. 1975.

攀援灌木；小枝圆柱形，密被贴伏的短柔毛。叶对生，薄纸质，长圆状披针形或披针形，长 8—11 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部渐窄或楔形，上面被稀疏的短柔毛，脉上毛较密，下面密被长柔毛；侧脉 6—8 对，向上拱曲，两面均明显；叶柄长 5—8 毫米，被短柔毛，腋部通常有 2—4 枚极退化的叶；托叶 2 深裂，裂片线形，长 6 毫米，早落。聚伞花序顶生，长约 4 厘米，分枝少而短，被短柔毛；苞片和小苞片线形，长 0.5—1.5 厘米；花密集，无梗；花萼管长圆形，长约 5 毫米，密被短柔毛，萼裂片线形，长 2.5—3 厘米，宽 1—2 毫米，有柔毛，顶端长渐尖；花叶卵形，白色，长约 6 厘米，有纵脉 5—7 条，顶端渐尖，基部圆形，两面被短柔毛，柄长 8.5 毫米；花冠管长 2—2.5 厘米，宽 1.5 毫米，外面被灰色短柔毛，内面在上部密生黄色棒形毛，花冠裂片卵形，长 3 毫米，宽 1.5 毫米，顶端渐尖或短尖，外面密被柔毛，内面密生黄色小疣突；雄蕊内藏，花药长 4—5 毫米，花丝无毛；花柱长 5 毫米，无毛。花期 9—11 月。