

下面苍白；侧脉每边 17—23 条，开展斜升，近平行；叶柄长 2—4 厘米，上面有沟；托叶卵形或披针形，长 1.5—2 厘米，宽达 1 厘米，渐尖，有明显的脉纹。花序为伞房状聚伞花序，腋生，很少顶生，四或五回分歧；苞片披针形或卵形，长 8—10 毫米，渐尖，有脉纹；花长约 14 毫米；萼管长约 3 毫米，裂片披针形，长渐尖，长 6—7 毫米，外面多少被柔毛；花冠外面被短柔毛，管筒状，长约 1 厘米，里面被长柔毛，裂片长圆状卵形；雄蕊生于花冠喉部，花丝长 1.5 毫米，花药线状披针形，长约 3 毫米，顶部伸出；花柱长 4 毫米。浆果近球形，长 3—4 毫米，径 4—5 毫米。花期 7—8 月，果期 10—11 月。

仅见于广西龙州大青山；生于海拔 560—700 米处的山谷水沟边石上。国外分布于越南北部。

4. 垂花密脉木 (云南种子植物名录)

Myrioneuron nutans Wall. ex Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 55. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 96. 1880; 云南种子植物名录, 下册: 1265. 1984.

直立小灌木，高约 1 米；枝粗壮，覆以很厚的苍白色海绵质树皮。叶革质，阔椭圆形或倒卵形，长 10—25 厘米，顶端骤然渐尖，干时绿色，下面被短柔毛；侧脉每边 15—20 条，近水平伸出；叶柄长 1.2—1.8 厘米；托叶三角状披针形，约与叶柄近等长。头状花序顶生和腋生，通常圆球状，直径 2.5—3.6 厘米，密花，很少疏松，总花梗短；苞片钻状，坚硬，宿存，长约 8 毫米；萼裂片与苞片的形状和长短均相似，伸至花冠之上；花冠白色，管状，花冠裂片短，顶端钝，背部被短柔毛。果干燥。花期 3 月。

产于云南蒙自窑头和西藏墨脱；生于海拔约 710 米处的林下。国外分布于印度东北部、孟加拉国吉大港。

本种的云南标本 (Hand.-Mazz. 5747) 编者未见。西藏为第一次记录，所据标本为李渤生和程树志 3803。

41. 腺萼木属 *Mycetia* Reinw.

Reinw. in Bl. Bijdr. 986. 1826 et Syll. Pl. Nov. Ratisb. 2: 9. 1928; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat Pflanzenfam. IV (4): 66. 1891; Deb in Bull. Bot. Surv. Ind. 28: 114. 1986; Lo in Guihaia 11 (2): 105. 1991. — *Adenosacme* Wall. ex Endl. Gen. 1: 552. 1838; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 69. 1873.

小灌木；老枝通常覆有草黄色或近白色的松软外皮。叶对生，常一片大一片小，很少等大，叶片膜质、纸质或革质，常有多对侧脉，有叶柄；托叶通常大而叶状，宿存或