

9. 萼管无毛或略被柔毛。

11. 萼裂片比萼管短。

12. 花小, 花冠长约 5 毫米; 托叶长三角形, 长 3—4 毫米 10. 短萼腺萼木 *M. brevisepala* Lo

12. 花较大, 花冠管长 9—16 毫米 11. 腺萼木 *M. glandulosa* Craib

11. 萼裂片与萼管近等长。

13. 花较小, 花冠长 7—8 毫米, 白色 12. 华腺萼木 *M. sinensis* (Hemsl.) Craib

13. 花较大, 花冠长超过 1 厘米, 黄色。

14. 叶片薄革质, 网脉明显; 萼裂片线形; 花梗纤细, 长 9—15 毫米 13. 纤梗腺萼木 *M. gracilis* Craib

14. 叶片纸质, 网脉不明显; 萼裂片披针形; 花梗长不超过 5 毫米 14. 长叶腺萼木 *M. longifolia* (Wall.) Kuntze

8. 花序腋生或生于无叶的节上; 叶薄革质, 有明显的网脉 15. 云南腺萼木 *M. yunnanica* Lo

1. 长花腺萼木 (中国高等植物图鉴)

Mycetia longiflora How ex Lo in Guihaia 11 (2): 107. 1991.

1a. 长花腺萼木 (原变型) 图版 83: 6—9

f. *longiflora*

灌木, 高 0.6—2 米; 嫩枝被短柔毛, 老枝粗壮, 白色, 无毛或近无毛。叶薄纸质, 长圆形或椭圆形, 长 12—18 厘米, 宽达 8 厘米, 顶端渐尖, 基部楔尖, 或渐狭而下延, 上面无毛或中脉上疏被短柔毛, 下面中脉和侧脉上被短绒毛; 中脉上面凹下, 下面平扁, 有 2 或 3 条纵线槽, 侧脉每边 11—15 条, 弧状斜升, 几平行, 下面平扁; 叶柄长 2—7 厘米, 被短绒毛; 托叶三角状卵形, 长约 5 毫米, 顶端圆钝, 有脉纹, 被微柔毛。聚伞花序顶生, 被短绒毛, 二或三回分枝, 有花 10 余朵, 总花梗长约 1 厘米或稍过之, 较粗壮; 花梗粗壮, 长约 5 毫米; 小苞片近披针形, 长约 4 毫米, 渐尖; 萼管半球状, 长 1.8—2 毫米, 被短绒毛, 裂片 5, 狭披针形, 常稍不等长, 长 4—6.5 毫米, 被短绒毛; 花冠黄色, 阔管状, 外面密被短柔毛, 管长 1.5—1.6 厘米, 里面中部以上或喉部被白色长柔毛, 裂片 5, 阔卵状三角形, 长 2—2.5 毫米, 反折; 雄蕊 5, 生喉部, 花丝极短, 花药线形, 长约 3 毫米; 花柱内藏。果近球形, 径约 5 毫米; 种子极多数, 小而有棱角。花期 8 月, 果期 10 月。

我国特有, 产于云南西南部和南部; 生于海拔 1 500—1 700 米处的密林下。模式标本采自云南镇康。

1b. 侯氏腺萼木 (变型) (广西植物)

f. *howii* Lo in Guihaia 11 (2): 108. 1991.

与原变型的区别是花冠无毛, 叶较小, 两面无毛。

我国特有, 产于云南西双版纳; 生于海拔约 1 600 米处的密林下, 少见。