

过1厘米,分枝纤长,有时丝状;花梗纤细,长9—15毫米;萼管陀螺状,长2.5毫米,干时黑色,无毛,裂片线形,渐尖,稍钝尖,与萼管近等长;花冠黄色,狭管状,干时黑色,管长1.4—1.6厘米,外面无毛,里面被疏柔毛,裂片长约3毫米,宽约1.5毫米;雄蕊内藏,花丝短,花药长约2毫米;花柱长约1.1厘米,被疏柔毛,柱头裂片长约3毫米。果球形或稍扁,径4—6毫米,无毛;种子微小,有棱角。花期8—9月,果期11—12月。

产于云南南部的思茅和西双版纳;生于海拔600—1300米处的林下溪边。国外分布于泰国北部。

14. 长叶腺萼木 (广西植物)

Mycetia longifolia (Wall.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 1: 289. 1891; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 66, fig. 26. 1891; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 205. 1979; Deb in Bull. Bot. Surv. India 14: 120. 1986; Lo in Guihaia 11 (2): 106. 1991. — *Rondeletia longifolia* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, 2: 137. 1824. — *Adenosacme longifolia* (Wall.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 95. 1880. — *Wendlandia longifolia* (Wall.) DC. Prodr. 4: 412. 1830.

灌木;枝易折断,嫩枝被柔毛,老枝覆有平滑、淡黄色或白色、松软的树皮,无毛。叶纸质,椭圆状披针形或椭圆形,在同一节上的叶多少不等大,长6—8厘米,有时可达20余厘米,宽3—7厘米或过之,顶端短渐尖或尾状长渐尖,基部楔形或渐狭,稍下延,上面散生糙伏毛状短毛,下面被密或稍疏的柔毛或微柔毛,脉上的毛很密;中脉上面压凹,下面凸起,侧脉每边13—20条,弯弧状,下面凸起;叶柄长0.6—2.5厘米,有时可达5厘米,被毛;托叶长圆状披针形,长8—10毫米,近短尖,多少被毛。聚伞花序顶生或腋生,二或三歧分枝,无毛或被毛,总花梗短;苞片有腺体,卵形或披针形,长4—9毫米;小苞片小;萼管陀螺状,长约2毫米,裂片稍厚,披针形,约与萼管等长,弯缺内有腺体;花冠黄色,狭管状,长13—15毫米,外面无毛或被柔毛,裂片小,阔卵形。果近球形,直径4—5毫米,成熟时白色;种子极多数,小而有棱角。

花期夏秋。

仅产于云南南部和西藏东南部的墨脱;生于林下。国外分布于喜马拉雅山地区、印度东北部、缅甸至马来西亚地区。

15. 云南腺萼木 (广西植物)

Mycetia yunnanica Lo in Guihaia 11 (2): 116. 1991.

灌木或亚灌木,高约1.5米;枝草黄色或近白色,无毛。叶薄革质,椭圆形或长圆形,有时倒卵形,长10—20厘米,宽3.5—6厘米,顶端骤然渐尖,基部楔形或渐狭,上面无毛,下面中脉上被极短的硬毛;中脉上面微压凹,下面凸起,侧脉每边12—18