

条，纤细，近边缘连成边脉，两面稍凸或仅下面凸起，小脉近平行；叶柄长1—3厘米，近无毛；托叶长圆形，长8—12毫米，顶端钝，无毛。花未见。果序腋生或在腋生分枝的近基部的无叶节上着生，总梗长约3厘米，和分枝均无毛；果近球形，径约4毫米，宿存萼裂片卵状三角形，长2.5—3毫米，宽2—2.5毫米，顶端钝。果期10月。

我国特有，产于云南德宏州梁河县；生于林下沟溪边。模式标本采自云南德宏梁河。

42. 尖叶木属 *Urophyllum* Jack ex Wall.

Jack ex Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey 2: 186.1824; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 71.1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 67. 1891; Bremek. in Journ. Arn. Arb. 21: 30.1940.

乔木或灌木；小枝圆柱状。叶对生，有柄；托叶大，生于叶柄间。头状聚伞花序或伞房状聚伞花序腋生，总花梗有或无；花两性或有时单性，通常小，具短的花梗，小苞片生于花梗基部；萼管短，陀螺状或杯状，球状或倒圆锥状，萼檐杯状，5齿裂，极少4—7齿裂，宿存；花冠革质，辐状，短管状或漏斗状，喉部被长柔毛，裂片5，极少4—7，三角形，镊合状排列；雄蕊5，极少4—7，着生于花冠喉部，花丝短，花药线形，短尖，内藏；花盘肥厚，环状，有沟槽；子房5室，极少4—7室，花柱短，基部常肿胀，柱头多式；胚珠每子房室多颗，胎座生于子房室内角。浆果小，4—5室；种子多数，细小，球形，种皮脆壳质，有孔隙；胚棒状，生于肉质胚乳中。

本属模式种：*Urophyllum glabrum* Wall.

约150种，分布于亚洲热带至非洲。我国有3种，产于广东、广西和云南三省区之南部。

分种检索表

1. 花冠裂片与冠管近等长。
 2. 花较大，萼管长约3毫米，花冠长约4毫米；小枝嫩部被柔毛 1. 尖叶木 *U. chinense* Merr. et Chun
 2. 花较小，萼管长约1.5毫米，花冠长约2毫米；小枝无毛 2. 小花尖叶木 *U. parviflorum* How ex Lo
1. 花冠裂片长约为冠管的1/2；小枝被柔毛 3. 滇南尖叶木 *U. tsaiianum* How ex Lo
 1. 尖叶木 (中国种子植物科属辞典)