

Urophyllum chinense Merr. et Chun in Sunyatsenia 2 (1): 19, pl. 10. 1934; Li in Journ. Arn. Arb. 24: 374. 1943; 中国高等植物图鉴 4: 230, 图 5874. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1276. 1984.

灌木或小乔木, 高1.5—4米; 小枝稍压扁, 有直槽, 嫩部被柔毛。叶对生, 近革质, 长圆形或长圆状披针形, 很少近卵形, 长10—20厘米, 宽3.5—5厘米, 顶端常尾状渐尖, 基部圆钝至短尖, 干时榄绿色, 下面脉上被贴状柔毛; 中脉在上面压入, 侧脉每边约8条, 下面明显凸起, 网状小脉构成略呈方格状的网眼; 叶柄长约1厘米; 托叶大, 狭披针状狭长圆形, 长1—1.7厘米, 顶端钝或短尖, 被柔毛。花序腋生, 对生, 伞房状, 花数朵至多朵, 总梗长4—5毫米或不及; 花梗常有棱角, 长4—6毫米, 均被柔毛; 小苞片披针形, 长约2毫米; 萼管杯状, 长约3毫米, 有5小齿, 被微柔毛; 花冠白色, 小, 革质, 长约4毫米, 里面喉部被密毛, 5裂达中部, 裂片近三角形; 花丝短, 花药近卵形; 子房5室, 花柱粗壮, 5裂。浆果近球状, 径约8毫米, 成熟时红色或橙黄色; 种子多数, 很小, 表面有洼点。花期7月, 果期8—9月。

产于广东西部和西南部, 广西东部和东南部, 云南东南部; 生于海拔700—900米处的山地丛林中。国外分布于越南北部。模式标本采自广西十万大山。

本种编者未见标本, 仅据《云南种子植物名录》的记载。

2. 小花尖叶木 (植物研究) 图版 86: 6—9

Urophyllum parviflorum How ex Lo in Bull. Bot. Res. 18 (3): 278. 1998.


灌木或小乔木; 棕红色, 除节上被硬毛外, 无毛。叶纸质, 长圆形或长圆状披针形, 长13—16厘米, 宽3—5厘米, 顶端骤然尾尖, 基部渐狭至短尖, 干时上面绿灰色, 无毛, 下面淡棕色, 沿中脉和侧脉被硬毛; 中脉上面压入, 下面高凸起, 侧脉每边约10条, 微呈弧状, 靠近边缘彼此联接, 下面高凸起, 网脉近平行; 叶柄上面有沟, 长5—8毫米, 边缘被硬毛; 托叶狭披针形, 长7—9毫米, 稍钝头, 被贴伏绢质长毛。花序腋生, 伞房状, 有花5—9朵; 总花梗长3—5毫米, 和花梗均被硬毛; 小苞片披针状线形, 长约2毫米, 被长硬毛; 萼管杯状, 长约1.5毫米, 有4或5浅齿, 下部被锈色柔毛; 花冠小, 长约2毫米, 4或5裂达中部, 裂片近三角形; 雄蕊4或5, 花丝短, 花药卵形, 长约0.4毫米, 药隔凸出; 子房4或5室, 花柱粗壮, 顶端4或5裂。果未见。花期5月。

我国特有, 产于云南金平南溪河。

3. 滇南尖叶木 (植物研究) 图版 86: 1—5

Urophyllum tsaianum How ex Lo in Bull. Bot. Res. 18 (3): 279. 1998.

灌木或小乔木, 高2—6米; 小枝红棕色, 近圆柱状, 被柔毛。叶纸质, 通常狭披针形或狭长圆形, 有时为长圆形或披针形, 两侧稍不对称, 长6—13.5厘米, 宽2—4厘米, 顶端渐尖或尾状渐尖, 基部钝或短尖, 干时淡棕色或绿灰色, 上面无毛, 下面脉上被贴伏短柔毛; 中脉上面压入, 侧脉纤细, 每边6—9条, 不达叶缘即分枝消失, 网



图版 86 1—5. 滇南尖叶木 *Urophyllum tsaianum* How ex Lo: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠剖开, 示雄蕊; 4. 雌蕊和花萼; 5. 子房横切。6—9. 小花尖叶木 *Urophyllum parviflorum* How ex Lo: 6. 叶; 7. 花; 8. 花冠剖开, 示雄蕊; 9. 花盘、花柱和柱头。(余汉平绘)