

1—3 朵生于刺状小枝之顶，单性或假杂性，雌雄异株；萼管杯状或管状，檐部 5 浅裂或近截平；花冠管状钟形或漏斗状，内外均无毛，檐部 5 裂，裂片在芽时旋转状排列，盛开时伸展；雄蕊 5，与花冠裂片互生，生喉部，不伸出，花丝极短，花药背着，雄花中发育正常，雌花中无花粉；子房 1 室，具 2 或 4 个侧膜胎座，花柱顶端 2 裂，裂片粘合，不伸出，胚珠多数，叠生。浆果较大，球形或椭圆状球形；种子多数，不沉没于胎座中，椭圆形。

本属模式种：*Ceriscoides turgida* (Roxb.) Tirveng.

约 10 种，主要分布于亚洲热带。我国 1 种。

1. 木瓜榄 (植物研究) 图版 88

Ceriscoides howii Lo in Bull. Bot. Res. 18 (3): 281. 1998.

灌木，高 3—4 米；枝和小枝灰黄色，均粗壮，侧生小枝常硬化成刺，刺长 2.5—4 毫米。叶密集于小枝或刺的顶部。叶片纸质，狭椭圆形或长圆状披针形，长 5—11 厘米，宽 1.5—4 厘米，顶端渐尖，稍钝头，基部钝或阔楔尖，很少近圆，干时榄绿色，下面较苍白，上面无毛，下面脉腋内簇生柔毛；中脉在下面凸起，侧脉每边 5—6 条，直或稍弯拱，不达边缘即分枝消失，下面凸起，上面不明显；叶柄长通常 3—5 毫米；托叶脱落未见。花单性或假杂性，雌雄异株；雄花常 2 或 3 朵簇生枝顶，近无梗；萼管状钟形，高约 6 毫米，檐部近截平或有 5 小齿，无毛；花冠淡黄色，管状钟形，长 1.4—1.5 厘米，基部直径约 3 毫米，喉部直径 6—7 毫米，内外均无毛，裂片 5，近圆形，长 3.5—4 毫米，顶端钝；雄蕊 5，生喉部，花丝几无，花药背着，披针形，长约 3.5 毫米，近露出；子房退化消失，花柱粗壮，长约 6 毫米，柱头 2 裂；雌花常单朵顶生；小苞片鳞片状，有粗齿；萼无毛，萼管长 11.5 毫米，子房之上缢缩，上部稍扩大，边缘有小齿或近截平；花冠外形同雄花，长约 1.7 厘米；雄蕊 5，花药常空虚；子房 1 室，有 2 或 4 个侧膜胎座，每胎座上有多数叠生胚珠，花柱粗壮，长 5—6 毫米，上部肿胀成球状，柱头 2 裂，粘合。浆果大，阔卵圆形、阔椭圆形或近球形，长 3.5—4.5 厘米，棕色；种子多数，暗棕色，稍光亮，长圆状或椭圆状，长 8—10 毫米。花期 10 月，果期翌年 4 月。


我国特有，产于海南崖县、保亭和万宁；生于海拔 400—600 米处的山谷林中。模式标本采自海南保亭什密村熬盆岭。

45. 山石榴属 *Catunaregam* Wolf

Wolf, Gen. Pl. Vocab. Char. Def. 75. 1776; Ross in Acta Bot.

Neerl. 15: 156. 1966; Tirveng. in Taxon 27 (5—6): 514. 1978;

K. M. Wong in Malay. Nat. Journ. 38: 24. 1984. ——*Ceriscus*



图版 88 木瓜槐 *Ceriscoides howii* Lo: 1. 雄花枝; 2. 雌花枝; 3. 叶; 4. 雄花; 5. 雄花花冠剖开, 示雄蕊和退化雌蕊; 6—7. 花药背腹面; 8. 退化雌蕊的柱头; 9. 雌花花冠剖开, 示不育雄蕊和发育雌蕊; 10. 花萼; 11. 子房横切; 12. 果实; 13. 种子。(余汉平绘)