

片2枚；花萼无毛，萼管钟形，长3.5—4毫米，檐部稍扩大，顶端5裂，裂片三角形，长1.5—2毫米，顶端渐尖；花冠白色，高脚碟状，冠管长14—20毫米，内面上部有短柔毛，花冠裂片5，披针形，长6—12毫米，开放时外反；雄蕊着生于花冠喉部，花药线状披针形，长约7毫米，伸出，花丝缺或极短；子房2室，花柱纤细，与柱头共长12—20毫米，柱头纺锤形，顶端2浅裂。浆果球形，直径5—7毫米，顶冠以宿存萼檐，果柄长5—8毫米；种子16—20颗。花期3—5月，果期5—12月。

产于广东、广西、海南、云南；生于低海拔的丘陵或旷野灌丛。国外分布于越南。模式标本采自广东，具体地点未详。

2. 多刺山黄皮 (海南植物志) 图版 90: 7—11


Fagerlindia depauperata (Drake) Tirveng. in Nord. Journ. Bot. 3 (4): 458. 1983. — *Randia depauperata* Drake in Morot, Journ. de Bot. 9: 217. 1895; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 228. 1923; 海南植物志 3: 321. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 236, 图 5886. 1975. — *Canthium spinosissima* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 2: 56. 1943.

有刺灌木，高1—3米；枝灰白色，小枝被短柔毛；刺腋生，对生，直或稍弯，长4—15毫米。叶薄纸质，对生，卵形、卵状长圆形或卵状披针形，长1.5—8.2厘米，宽1—3厘米，顶端渐尖至尾状渐尖，基部圆钝至阔楔形，上面无毛，下面无毛或散生短柔毛，中脉和侧脉上的毛常较密；侧脉纤细，2—4对，在下面稍明显；叶柄长2—6毫米，被短柔毛；托叶狭三角形，顶端长尖，被短柔毛，长3—4毫米。花常1或2朵，很少3朵聚生于腋生的短枝上，短枝有叶或无叶；花梗纤细，长6—10毫米，被短柔毛；花萼被短柔毛，萼管钟形，长3.5—4毫米，檐部稍扩大，顶端5裂，裂片狭三角形，长1—2毫米，顶端尖；花冠白色，高脚碟状，外面无毛，冠管长3—4.5毫米，花冠裂片5，长圆形，长5—5.5毫米，边缘有短缘毛，开放时外反；花药伸出，线状长圆形，长约3毫米；子房2室，每室有胚珠约5颗，花柱纤细，长约5毫米，无毛，柱头纺锤形。浆果球形，有疏柔毛，直径5—6毫米，紫黑色，顶冠以宿存萼檐，果柄纤细，有疏柔毛，长0.5—1.5厘米。花期4月，果期5月至翌年1月。

产于广西博白、钦州和海南；生于海拔50—300米处的山地、丘陵的林中或灌丛。国外分布于越南。

47. 鸡爪筋属 *Oxyceros* Lour.

Lour. Fl. Cochinch. 150. 1790; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. 45: 339. 1970; K. M. Wong in Malay. Nat. Journ. 38: 34. 1984. — *Randia* Linn. Sect. *Oxyceros* DC. Prodr. 4: 385.



图版 90 1—6. 浓子茉莉 *Fagerlindia scandens* (Thunb.) Tirveng.: 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 花; 4. 部分花冠展开, 示雄蕊; 5. 部分花萼和雌蕊, 示子房纵切面; 6. 果。7—11. 多刺山黄皮 *Fagerlindia depauperata* (Drake) Tirveng.: 7. 花枝; 8. 花蕾; 9. 花; 10. 部分花冠展开, 示雄蕊; 11. 果。(黄少容绘)