

录, 下册: 1270. 1984. ——*Aidia acuminatissima* (Merr.) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **29**: 238. 1939; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 338. 1970.

无刺灌木或乔木, 高 2—12 米; 嫩枝、叶下面和花序被锈色柔毛。叶革质或纸质, 对生, 长圆形、长圆状披针形或长圆状倒披针形, 长 8—27.5 厘米, 宽 2—10 厘米, 顶端渐尖至尾状渐尖, 渐尖部分长可达 2.5 厘米, 直或弯曲, 基部楔形, 两侧有时稍不对称, 干时赤褐色, 上面无毛, 稍光亮; 侧脉 10—14 对, 与网脉均在下面凸起; 叶柄长 5—15 毫米, 被柔毛; 托叶披针形, 长 8—12 毫米, 顶端长尖, 被短柔毛。聚伞花序与叶对生, 多花, 长 4—6 厘米, 宽 5—12 厘米; 苞片和小苞片线状披针形, 长 2—4 毫米; 花梗长 1.5—4 毫米; 花萼被锈色柔毛, 萼管杯形, 长 4—5 毫米, 檐部稍扩大, 顶端 5 裂, 裂片三角形, 顶端尖, 长 1—2 毫米; 花冠白色或淡黄色, 高脚碟形, 外面无毛, 冠管长约 4 毫米, 喉部密被长柔毛, 花冠裂片 5, 长圆状倒披针形, 长 7—9 毫米, 宽 2—2.5 毫米, 开放时反折; 花药线状披针形, 伸出, 长约 7 毫米, 花丝长约 2.5 毫米; 子房 2 室, 花柱和柱头长 7—8 毫米, 无毛, 柱头纺锤形, 有浅槽纹。浆果球形, 直径 6—8 毫米, 有锈色疏毛或近无毛, 干时黑色, 顶部有环状的萼檐残迹。花期 3—9 月, 果期 4—12 月。

产于福建南靖和永泰, 广东乐昌、茂名、阳江、翁源、高州、高要、英德、信宜、清远、增城、新丰、罗定、广州、从化、台山、新会、大埔、丰顺、海丰、博罗、云浮、新兴和怀集, 香港, 广西河池、巴马、那坡、浦北、钦州、东兴、邕宁、蒙山、融水、凌云、乐业、平乐、金秀、平南、临桂、扶绥和宁明, 海南崖县、保亭、陵水、万宁、昌江、乐东、琼中、东方、儋县、白沙、琼海, 云南河口、麻栗坡、金平、屏边和富宁; 生于海拔 20—1 000 米处的旷野、丘陵、山坡、山谷溪边林中或灌丛中。国外分布于越南。

2. 瑞丽茜树 (云南种子植物名录)

Aidia shweliensis (Anth.) W. C. Chen, comb. nov. ——*Randia shweliensis* Anth. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **18**: 205. 1934; 云南种子植物名录, 下册: 1270. 1984.

灌木, 高达 10 米; 小枝无刺, 淡褐色, 当年生的小枝被长柔毛, 越年生枝近无毛。叶椭圆形或长圆状披针形, 长达 12 厘米, 宽 4 厘米, 顶端短渐尖, 基部楔形, 上面无毛, 下面在脉上被柔毛; 叶柄长约 5 毫米; 托叶三角形, 短尖。聚伞花序腋生, 被柔毛; 花肉质; 花梗粗壮, 长 6 毫米; 花萼杯形, 长 7 毫米, 顶部 5 裂, 裂片三角形, 短尖, 长 5 毫米, 宽 2.5 毫米, 外面无毛, 内面被长柔毛; 花冠白色, 冠管狭, 圆筒形, 长 2 厘米, 花冠裂片开展, 长 1.5 厘米, 宽 5 毫米; 花丝短, 花药长 8 毫米; 子房 2 室, 具多数胚珠, 花柱稍厚, 长 2 厘米, 柱头棒状, 2 裂。花期 6 月。

产于云南西部; 生于海拔 1 800—2 000 米处的山谷溪边疏林中。模式标本采自云南瑞丽至怒江分水岭。

标本未见。

3. 滇茜树 (云南种子植物名录)

Aidia yunnanensis (Hutchins.) Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 339. 1970. — *Randia yunnanensis* Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 400. 1916; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1020. 1936; 云南种子植物名录, 下册: 1271. 1984.

无刺灌木或小乔木, 高 2—7 米; 枝无毛。叶纸质或薄革质, 对生, 椭圆状披针形或长圆状披针形, 长 6.2—17.5 厘米, 宽 2.7—6.5 厘米, 顶端渐尖至尾状渐尖, 基部楔形, 常不等侧, 干时常呈赤褐色, 仅在下面中脉和侧脉上有糙伏毛; 侧脉 7—10 对, 在下面凸起, 在上面稍明显, 近边缘弯拱而常连结; 叶柄长 3—6 毫米, 无毛; 托叶披针形, 顶端尖, 长 4—7 毫米, 脱落。花数至多朵簇生于无叶的节上或与叶对生, 无总花梗; 花梗长 2—3 毫米, 有倒生的硬毛; 萼管钟形, 被倒生的硬毛, 长 2—2.5 毫米, 檐部扩大, 顶部 5 裂, 裂片三角形, 长 0.5—0.7 毫米, 顶端尖; 花冠白色, 漏斗形, 冠管长 3 毫米, 外面无毛, 喉部有长柔毛, 花冠裂片 5, 长圆形, 开放时反折, 长 4—5 毫米, 宽 2 毫米; 花药伸出, 长约 5 毫米; 花柱和柱头长约 1 厘米, 柱头棒形, 伸出。果球形, 直径 5—8 毫米, 疏被微柔毛或无毛, 鲜时红色, 干时黑色; 种子多数。花期 3—5 月, 果期 5 月至翌年 1 月。

产于云南南部。生于海拔 540—1 640 米处的丘陵或山地的灌丛或林中。模式标本采自云南思茅县。

4. 柳叶香楠 (广西植物名录)

Aidia salicifolia (Li) Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 339. 1970. — *Randia salicifolia* Li in Journ. Arn. Arb. **24**: 456. 1943.

无刺灌木, 直立, 高约 1 米; 枝和小枝纤细, 圆柱形, 无毛, 小枝直径约 1.5 毫米。叶纸质, 对生, 狭披针形, 长 8.5—23 厘米, 宽 0.5—3 厘米, 顶端长渐尖, 基部楔形或短尖, 上面深橄榄绿色, 下面较苍白, 两面无毛, 或在下面中脉和侧脉上有疏柔毛; 侧脉 9—12 对, 纤细, 在近边缘处弯拱上升, 在下面凸起, 在上面稍凸起或平, 或有时不明显, 网脉不明显; 叶柄长 2—8 毫米, 无毛; 托叶披针形, 无毛, 顶端长尖, 长 0.3—1 厘米, 脱落。花未见。果序和叶对生, 聚伞状, 长约 1.5 厘米; 果球形, 直径约 8 毫米, 干时黑色, 光亮, 果柄长约 4 毫米。果期 11 月。

产于广西平南、容县、博白、金秀; 生于海拔 600—1 000 米处的山地林中。模式标本采自广西平南县寨山大桥顶。

5. 香楠 (海南) 水棉木 (广西植物名录)、台北茜草树 (台湾植物志) 图版 92: 1—7

Aidia canthioides (Champ. ex Benth.) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **28**: 118. 1938; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 338. 1970. — *Randia can-*