

标本未见。

3. 滇茜树 (云南种子植物名录)

Aidia yunnanensis (Hutchins.) Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 339. 1970. — *Randia yunnanensis* Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 400. 1916; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1020. 1936; 云南种子植物名录, 下册: 1271. 1984.

无刺灌木或小乔木, 高 2—7 米; 枝无毛。叶纸质或薄革质, 对生, 椭圆状披针形或长圆状披针形, 长 6.2—17.5 厘米, 宽 2.7—6.5 厘米, 顶端渐尖至尾状渐尖, 基部楔形, 常不等侧, 干时常呈赤褐色, 仅在下面中脉和侧脉上有糙伏毛; 侧脉 7—10 对, 在下面凸起, 在上面稍明显, 近边缘弯拱而常连结; 叶柄长 3—6 毫米, 无毛; 托叶披针形, 顶端尖, 长 4—7 毫米, 脱落。花数至多朵簇生于无叶的节上或与叶对生, 无总花梗; 花梗长 2—3 毫米, 有倒生的硬毛; 萼管钟形, 被倒生的硬毛, 长 2—2.5 毫米, 檐部扩大, 顶部 5 裂, 裂片三角形, 长 0.5—0.7 毫米, 顶端尖; 花冠白色, 漏斗形, 冠管长 3 毫米, 外面无毛, 喉部有长柔毛, 花冠裂片 5, 长圆形, 开放时反折, 长 4—5 毫米, 宽 2 毫米; 花药伸出, 长约 5 毫米; 花柱和柱头长约 1 厘米, 柱头棒形, 伸出。果球形, 直径 5—8 毫米, 疏被微柔毛或无毛, 鲜时红色, 干时黑色; 种子多数。花期 3—5 月, 果期 5 月至翌年 1 月。

产于云南南部。生于海拔 540—1 640 米处的丘陵或山地的灌丛或林中。模式标本采自云南思茅县。

4. 柳叶香楠 (广西植物名录)

Aidia salicifolia (Li) Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 339. 1970. — *Randia salicifolia* Li in Journ. Arn. Arb. **24**: 456. 1943.

无刺灌木, 直立, 高约 1 米; 枝和小枝纤细, 圆柱形, 无毛, 小枝直径约 1.5 毫米。叶纸质, 对生, 狭披针形, 长 8.5—23 厘米, 宽 0.5—3 厘米, 顶端长渐尖, 基部楔形或短尖, 上面深橄榄绿色, 下面较苍白, 两面无毛, 或在下面中脉和侧脉上有疏柔毛; 侧脉 9—12 对, 纤细, 在近边缘处弯拱上升, 在下面凸起, 在上面稍凸起或平, 或有时不明显, 网脉不明显; 叶柄长 2—8 毫米, 无毛; 托叶披针形, 无毛, 顶端长尖, 长 0.3—1 厘米, 脱落。花未见。果序和叶对生, 聚伞状, 长约 1.5 厘米; 果球形, 直径约 8 毫米, 干时黑色, 光亮, 果柄长约 4 毫米。果期 11 月。

产于广西平南、容县、博白、金秀; 生于海拔 600—1 000 米处的山地林中。模式标本采自广西平南县寨山大桥顶。

5. 香楠 (海南) 水棉木 (广西植物名录)、台北茜草树 (台湾植物志) 图版 92: 1—7

Aidia canthioides (Champ. ex Benth.) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **28**: 118. 1938; Yamazaki in Journ. Jap. Bot. **45**: 338. 1970. — *Randia can-*