

于叶柄间，厚，三角形或卵形，有刚毛。花单生于抑缩的侧生短枝的顶端，有时生于茎顶；萼钟状，顶端5裂；冠管圆筒形，外面无毛，内面被硬毛，花冠裂片5，旋转排列；雄蕊5枚，着生于花冠喉部，花药线形，稍伸出，花丝极短或无；子房无毛，2室，每室有胚珠2颗，花柱丝状，柱头纺锤形，无毛，常2裂，伸出。浆果球形；种子1—4颗。

约2种，分布于巴基斯坦、印度、锡金、不丹和我国。我国有1种，分布于云南和四川。

本属模式种：*Himalrandia tetrasperma* (Wall. ex Roxb.) Yamazaki

1. 须弥茜树 (云南植物研究) 丽江山石榴 (云南种子植物名录) 图版 94

Himalrandia lichiangensis (W. W. Smith) Tirveng. in Nord. Journ. Bot. 3 (4): 462. 1983. — *Randia lichiangensis* W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 200. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (4): 1020. 1936; 云南种子植物名录, 下册: 1270. 1984; 横断山区维管植物, 下册: 1892. 1994.


无刺灌木，高0.6—3米，多分枝；枝粗壮，坚硬。叶纸质或薄革质，常簇生于抑缩的侧生短枝上，倒卵形或倒卵状匙形，长1—6.5厘米，宽0.6—3.5厘米，顶端短尖或稍钝，基部楔形，干时常呈黑色，两面有贴生的糙伏毛，在下面常在脉上较密；侧脉3—5对，在下面稍明显；叶柄长约1毫米或近无柄；托叶卵形，长约5毫米。花单朵顶生于抑缩的侧生短枝上，近无花梗；花萼长约3毫米，外面有疏柔毛，萼裂片5，三角形，顶端短尖，具缘毛；花冠黄色，冠管长约3毫米，内面被白色硬毛，花冠裂片卵形，长约5毫米，开展；雄蕊5枚，伸出，花丝极短，花药线形，长约3毫米；柱头纺锤形。浆果球形，直径5—6毫米；种子椭圆形，1—2颗，直径约3毫米。花期5月，果期7—11月。

产于云南北部，四川康定、泸定、稻城、木里；生于海拔1400—2400米处的山坡、山谷沟边的林中或灌丛中。模式标本采自云南丽江。

52. 短萼齿木属 *Brachytome* Hook. f.

Hook. f. Hook. Ic. Pl. 11: 70, pl. 1088. 1871; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 87. 1873.

灌木或小乔木。叶对生，具柄；托叶在叶柄间，三角形。花小，白色，杂性异株，组成腋生或与叶对生的圆锥状的聚伞花序，有小苞片；萼管长圆形、倒圆锥形或长卵形，萼檐杯形，顶部5裂，宿存；花冠管状漏斗形或近圆筒形，冠管内面和喉部无毛，顶部5裂，裂片短，旋转排列；雄蕊5枚，着生于冠管喉部，内藏，花丝极短，花药线状长圆形，背着，在雌花中的很不完全；花盘在雌花中的小，环形，在雄花中的较大，



图版 94 须弥茜树 *Himalrandia lichiangensis* (W. W. Smith) Tirveng.: 1. 花果枝; 2. 花; 3. 雄蕊正面; 4. 雄蕊背面; 5. 部分花萼和雌蕊, 示子房纵切面; 6. 果。(黄少容绘)