

于叶柄间，厚，三角形或卵形，有刚毛。花单生于抑缩的侧生短枝的顶端，有时生于茎顶；萼钟状，顶端5裂；冠管圆筒形，外面无毛，内面被硬毛，花冠裂片5，旋转排列；雄蕊5枚，着生于花冠喉部，花药线形，稍伸出，花丝极短或无；子房无毛，2室，每室有胚珠2颗，花柱丝状，柱头纺锤形，无毛，常2裂，伸出。浆果球形；种子1—4颗。

约2种，分布于巴基斯坦、印度、锡金、不丹和我国。我国有1种，分布于云南和四川。

本属模式种：Himalrandia tetrasperma (Wall. ex Roxb.) Yamazaki

1. 须弥茜树 (云南植物研究) 丽江山石榴 (云南种子植物名录) 图版 94

Himalrandia lichiangensis (W. W. Smith) Tirveng. in Nord. Journ. Bot. 3 (4): 462. 1983. — *Randia lichiangensis* W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 200. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7 (4): 1020. 1936; 云南种子植物名录，下册：1270. 1984; 横断山区维管植物，下册：1892. 1994.

无刺灌木，高0.6—3米，多分枝；枝粗壮，坚硬。叶纸质或薄革质，常簇生于抑缩的侧生短枝上，倒卵形或倒卵状匙形，长1—6.5厘米，宽0.6—3.5厘米，顶端短尖或稍钝，基部楔形，干时常呈黑色，两面有贴生的糙伏毛，在下面常在脉上较密；侧脉3—5对，在下面稍明显；叶柄长约1毫米或近无柄；托叶卵形，长约5毫米。花单朵顶生于抑缩的侧生短枝上，近无花梗；花萼长约3毫米，外面有疏柔毛，萼裂片5，三角形，顶端短尖，具缘毛；花冠黄色，冠管长约3毫米，内面被白色硬毛，花冠裂片卵形，长约5毫米，开展；雄蕊5枚，伸出，花丝极短，花药线形，长约3毫米；柱头纺锤形。浆果球形，直径5—6毫米；种子椭圆形，1—2颗，直径约3毫米。花期5月，果期7—11月。

产于云南北部，四川康定、泸定、稻城、木里；生于海拔1400—2400米处的山坡、山谷沟边的林中或灌丛中。模式标本采自云南丽江。

52. 短萼齿木属 *Brachytome* Hook. f.

Hook. f. Hook. Ic. Pl. 11: 70, pl. 1088. 1871; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 87. 1873.

灌木或小乔木。叶对生，具柄；托叶在叶柄间，三角形。花小，白色，杂性异株，组成腋生或与叶对生的圆锥状的聚伞花序，有小苞片；萼管长圆形、倒圆锥形或长卵形，萼檐杯形，顶部5裂，宿存；花冠管状漏斗形或近圆筒形，冠管内面和喉部无毛，顶部5裂，裂片短，旋转排列；雄蕊5枚，着生于冠管喉部，内藏，花丝极短，花药线状长圆形，背着，在雌花中的很不完全；花盘在雌花中的小，环形，在雄花中的较大，

杯形；子房2室，胚珠每室多数，着生于盾状的隔膜胎座上，花柱线形，在雄花中的短，柱头2裂，裂片短，长圆形，有槽纹。浆果小，2室；种子多数，密集，常呈楔形，扁平，种皮有网纹，胚乳肉质；胚小，近圆柱形。

约5种，分布于印度、不丹、缅甸、孟加拉、越南、马来西亚至我国南部和西南部。我国有3种、1变种。

本属模式种：短萼齿木 *Brachytome wallichii* Hook. f.

分种检索表

1. 小枝、叶、花序等无毛。

2. 花序较小，长3—4厘米，宽3—5厘米，分枝较紧密；浆果椭圆形，较大，长1—1.5厘米，直径约8毫米 1. 短萼齿木 *B. wallichii* Hook. f.

2. 花序（果时）较大，长3—8厘米，宽3—5厘米，分枝扩展；浆果近球形，较小，长约6毫米，直径约5毫米 2. 海南短萼齿木 *B. hainanensis* C. Y. Wu ex W. C. Chen

1. 小枝、叶、花序等有毛。

3. 叶上面粗糙，常被疏而极微小的短硬毛，叶下面密被灰褐色的短硬毛 3. 滇短萼齿木 *B. hirtellata* Hu

3. 叶上面不粗糙，无毛或近无毛，叶下面疏被微硬毛或近无毛，毛在脉上较密 3b. 疏毛短萼齿木 var. *glabrescens* W. C. Chen

1. 短萼齿木（中国种子植物科属辞典） 图版95：9—10

Brachytome wallichii Hook. f. Hook. Ic. Pl. 11: 70. pl. 1088. 1871; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 108. 1880; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 262, fig. 20: 2—7. 1923; 横断山区维管植物，下册：1891. 1994.

灌木或小乔木，高1.5—3米，全株无毛，小枝柔弱而广展，圆柱形。叶纸质，长圆形或长圆状披针形，长9—14厘米，宽2.5—4.5厘米，顶端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，干时下面常呈赤褐色；侧脉8—10对，纤细，在下面稍凸起，叶柄长0.3—1厘米；托叶在叶柄间，三角形，顶端钻状长尖，长0.6—1.5厘米。聚伞花序腋生或与叶对生，长3—4厘米，宽3—5厘米，不规则分枝；总花梗和花梗纤细；小苞片狭三角形，长约1.5毫米；花梗长5—10毫米；雄花小，长约4毫米，萼管倒圆锥形，花冠白色，近圆筒形，有线形的小斑点；雌花较大，长约8毫米，萼管长卵形，花冠白色，近漏斗形。浆果椭圆形，长1—1.5厘米，直径约8毫米，顶冠以宿存的萼檐，果柄纤细，长0.7—2厘米；种子多数，密聚，楔形，长约1.5毫米，上部宽约2毫米。 果期9—10月。

产于云南西北部；生于海拔1250—2000米处的山谷林中。国外分布于印度、不丹、缅甸、孟加拉国和越南。