

杯形；子房2室，胚珠每室多数，着生于盾状的隔膜胎座上，花柱线形，在雄花中的短，柱头2裂，裂片短，长圆形，有槽纹。浆果小，2室；种子多数，密集，常呈楔形，扁平，种皮有网纹，胚乳肉质；胚小，近圆柱形。

约5种，分布于印度、不丹、缅甸、孟加拉、越南、马来西亚至我国南部和西南部。我国有3种、1变种。

本属模式种：短萼齿木 *Brachytome wallichii* Hook. f.

分种检索表

1. 小枝、叶、花序等无毛。

2. 花序较小，长3—4厘米，宽3—5厘米，分枝较紧密；浆果椭圆形，较大，长1—1.5厘米，直径约8毫米 1. 短萼齿木 *B. wallichii* Hook. f.

2. 花序（果时）较大，长3—8厘米，宽3—5厘米，分枝扩展；浆果近球形，较小，长约6毫米，直径约5毫米 2. 海南短萼齿木 *B. hainanensis* C. Y. Wu ex W. C. Chen

1. 小枝、叶、花序等有毛。

3. 叶上面粗糙，常被疏而极微小的短硬毛，叶下面密被灰褐色的短硬毛 3. 滇短萼齿木 *B. hirtellata* Hu


3. 叶上面不粗糙，无毛或近无毛，叶下面疏被微硬毛或近无毛，毛在脉上较密 3b. 疏毛短萼齿木 var. *glabrescens* W. C. Chen

1. 短萼齿木（中国种子植物科属辞典） 图版95：9—10

Brachytome wallichii Hook. f. Hook. Ic. Pl. 11: 70. pl. 1088. 1871; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 108. 1880; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 262, fig. 20: 2—7. 1923; 横断山区维管植物，下册：1891. 1994.

灌木或小乔木，高1.5—3米，全株无毛，小枝柔弱而广展，圆柱形。叶纸质，长圆形或长圆状披针形，长9—14厘米，宽2.5—4.5厘米，顶端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，干时下面常呈赤褐色；侧脉8—10对，纤细，在下面稍凸起，叶柄长0.3—1厘米；托叶在叶柄间，三角形，顶端钻状长尖，长0.6—1.5厘米。聚伞花序腋生或与叶对生，长3—4厘米，宽3—5厘米，不规则分枝；总花梗和花梗纤细；小苞片狭三角形，长约1.5毫米；花梗长5—10毫米；雄花小，长约4毫米，萼管倒圆锥形，花冠白色，近圆筒形，有线形的小斑点；雌花较大，长约8毫米，萼管长卵形，花冠白色，近漏斗形。浆果椭圆形，长1—1.5厘米，直径约8毫米，顶冠以宿存的萼檐，果柄纤细，长0.7—2厘米；种子多数，密聚，楔形，长约1.5毫米，上部宽约2毫米。 果期9—10月。

产于云南西北部；生于海拔1250—2000米处的山谷林中。国外分布于印度、不丹、缅甸、孟加拉国和越南。



图版 95 1—8. 滇短萼齿木 *Brachytome hirtellata* Hu var. *hirtellata*: 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 花; 4. 花冠展开, 示雄蕊; 5. 雄蕊; 6. 部分花萼和雌蕊, 示子房纵切面; 7. 果; 8. 种子。9—10. 短萼齿木 *Brachytome wallichii* Hook. f.: 9. 果枝; 10. 果。(黄少容绘)