

2. 海南短萼齿木 (广西植物)

Brachytome hainanensis C. Y. Wu ex W. C. Chen in *Guihaia* 7 (4): 298. 1987. — *B. wallichii* auct. non Hook. f. (1871): Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* 11: 55. 1932; 海南植物志 3: 328, 图 749. 1974.

灌木, 高约 3 米, 无毛; 小枝圆柱形。叶纸质, 长圆形或椭圆状披针形, 长 7—20.5 厘米, 宽 2.5—7 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形, 干时常褐色; 侧脉 8—12 对, 在下面凸起; 叶柄长 0.4—1.5 厘米, 托叶三角形, 顶端具硬尖, 长 5—8 毫米。聚伞花序 (果实时) 长 3—8 厘米, 宽 3—5 厘米, 扩展, 腋生或与叶对生, 总花梗和分枝纤细; 苞片三角形, 长约 1 毫米; 花未见。浆果近球形, 红色, 顶冠以宿存的萼檐, 直径约 5 毫米, 长约 6 毫米; 种子小, 密聚, 楔形, 扁, 黄色, 宽约 1.5 毫米。果期 3 月。

产于海南白沙和琼中; 生于林中。越南亦有分布。模式标本采自海南白沙县圆门峒。

3. 滇短萼齿木 (中国高等植物图鉴)

Brachytome hirtellata Hu in *Bull. Fan Mem. Inst. Biol.* 10: 164. 1940; 中国高等植物图鉴 4: 241, 图 5895. 1975.

3a. 滇短萼齿木 (原变种) 图版 95: 1—8

var. *hirtellata*

灌木, 高约 3 米; 小枝纤细, 密被短硬毛。叶对生, 在花序着生处常因节间缩短而呈三叶轮生状; 叶片膜质或薄纸质, 倒披针形或长圆状披针形, 长 7—21.5 厘米, 宽 2—6 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形或渐尖, 全缘, 上面粗糙, 常被疏而极微小的短硬毛, 在中脉上的毛较密, 下面密被灰褐色的短硬毛; 侧脉 12—20 对; 叶柄长 2—5 毫米; 密被短硬毛; 托叶基部宽, 上部芒状长尖, 长约 8 毫米, 密被硬毛。聚伞花序与叶对生, 常短, 密被短硬毛, 通常有花 5—10 朵, 稍稠密; 苞片线状钻形, 长约 8 毫米; 小苞片 2 枚, 线状披针形, 长约 2.5 毫米; 花梗短而细, 长约 8 毫米; 萼长 5 毫米, 裂片线状披针形, 长 2 毫米; 花冠漏斗形, 白色或黄白色, 干时黑色, 长 8 毫米, 无毛, 裂片 5, 卵形, 长 2 毫米; 雄蕊 5 枚, 花丝无毛, 长 1.5 毫米, 花药长 3 毫米; 子房陀螺形; 花柱无毛, 长 5.5 毫米, 柱头 2 裂, 长 0.5 毫米。浆果球形, 直径约 8 毫米, 红色, 密被短硬毛, 顶部有宿存的萼檐; 种子多数, 赤黄色, 楔形, 扁平, 长 1.5 毫米, 顶部宽约 1.5 毫米, 下部宽约 1 毫米。花期 3—6 月, 果期 4—12 月。

产于云南屏边、金平、河口、富宁; 生于海拔 700—1 600 米处的山谷溪边的林中或灌丛中。模式标本采自云南屏边。

3b. 疏毛短萼齿木 (变种) (植物分类学报)

var. *glabrescens* W. C. Chen in *Acta Phytotax. Sinica* 22 (2): 147. 1984; 横断山区维管植物, 下册: 1891. 1994.