

in Sargent, Pl. Wils. 3: 401. 1916. — *Tricalysia fruticosa* (Hemsl.) K. Schum. ap. E. Pritz. in Bot. Jahrb. 29: 582. 1901; Chun in Sunyatsenia 1: 314. 1934; 中国高等植物图鉴 4: 240, 图 5894. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1274. 1984; 湖北植物大全 400. 1993.

灌木或乔木, 高 1—8 (—15) 米; 嫩枝有短柔毛。叶纸质或薄革质, 长圆形、长圆状披针形或狭椭圆形, 长 5.5—22 厘米, 宽 2.5—8 厘米, 顶端短渐尖或尾状渐尖, 基部短尖或楔形, 少为钝圆, 有时两侧稍偏斜, 全缘, 叶脉上和脉腋内常有疏短柔毛, 其余部分无毛或散生短柔毛; 侧脉 7—13 对, 在下面凸起, 在上面扁平或稍凹陷, 网脉在下面明显; 叶柄长 4—13 毫米, 常有短刚毛; 托叶基部合生, 披针形, 长 8—10 毫米, 被柔毛。伞房状的聚伞花序腋生, 多花, 总花梗很短; 花有短花梗; 花萼被短柔毛, 长约 3 毫米, 萼管陀螺形, 萼檐浅 4 裂, 裂片三角形, 长 0.5—0.8 毫米; 花冠白色, 少黄色, 长 6—7 毫米, 冠喉部被柔毛, 裂片长圆形, 比冠管长, 外反; 雄蕊伸出; 花柱长 2.5—3.5 毫米, 柱头 2 裂, 长约 1.5 毫米, 伸出。果近球形, 有短柔毛或无毛, 直径 5—7 毫米, 成熟时红色, 果柄长 0.3—1 厘米, 纤细。花期 3—5 月, 果期 6 月至翌年 2 月。

产于江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏墨脱; 生于海拔 220—2 000 米处的山谷或溪边的林中或灌丛中。国外分布于越南。模式标本采自湖北宜昌。

3. 云南狗骨柴 (新拟) 多毛狗骨柴 (云南种子植物名录)

Diplospora mollissima Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 401. 1916. — *Tricalysia mollissima* (Hutchins.) Hu in Journ. Arn. Arb. 5: 233. 1924; 云南种子植物名录, 下册: 1274. 1984.

灌木或乔木, 高 2—8 米; 小枝被绒毛或短柔毛。叶纸质或薄革质, 长圆形或长圆状倒披针形, 长 5—24 厘米, 宽 2—7.5 厘米, 顶端渐尖或短尖, 尖端常钝, 基部楔形或钝圆, 全缘, 有时两侧稍偏斜, 上面除中脉被短柔毛外, 余皆无毛, 下面被绒毛; 侧脉 7—10 对, 在下面凸起; 叶柄长 4—10 毫米, 有绒毛; 托叶三角形, 下部连合, 上部渐尖, 长约 1 厘米, 外面有短柔毛。花具很短的花梗, 组成腋生、稠密的聚伞花序; 花萼陀螺形, 长 1.25 毫米, 裂片小, 被微柔毛; 花冠白色, 冠管长约 3 毫米, 无毛, 裂片 4, 长圆状椭圆形, 长 3.5 毫米, 宽 2 毫米; 雄蕊伸出, 花丝长 1.5 毫米, 无毛, 花药长 3 毫米; 花柱无毛, 2 裂, 长 5 毫米。果近球形, 直径 5—7 毫米, 成熟时红色, 通常有短柔毛, 顶部有宿存的萼, 果柄常有柔毛。花期 5—6 月, 果期 6—12 月。

产于云南南部和西部。生于海拔 760—1 900 米处的山地或溪边的林中。模式标本采自云南思茅县。