

54. 瓶花木属 *Scyphiphora* Gaertn. f.

Gaertn. f. Fruct. 3: 91, t. 196. fig. 2. 1805; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 99. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 80. 1891.

灌木或小乔木；枝圆柱形，粗壮，多节而节间短，幼时有胶状物质，叶对生，具柄；托叶在叶柄间，阔而短。花小，组成具短总花梗、密花、腋生二歧式的聚伞花序；萼管长倒圆锥形，萼檐杯形，顶部近截平或具4—5微小齿，宿存；花冠管圆筒形，喉部稍扩大，有毛，檐部4—5裂，裂片长圆形，广展或外弯，旋转排列；雄蕊4—5枚，着生于花冠裂片间，花丝钻形，短，花药背着，线状箭形；花盘环状，分裂；子房下位，2室，室狭每室有胚珠2颗，着生于隔膜的中部，一直立，一倒垂，珠柄连接成一假隔膜将室再分为2，花柱线形，柱头2。核果长圆状圆柱形，有纵棱；分核2个，粘连在一起，脆壳质，有纵棱5条，种子长圆状圆柱形，渐弯，种皮膜质，胚乳少，子叶长圆形，胚根长。

单种属。

分布于亚洲南部至东南部，南至加罗林群岛、澳大利亚和新喀里多尼亚。我国海南亦有。

1. 瓶花木（中国种子植物科属辞典） 厚皮（海南文昌） 图版 97

*Scyphiphora hydrophyllacea* Gaertn. f. Fruct. 3: 91, t. 196. fig. 2. 1805; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 281. 1923; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 191, fig. 22. 1940; 海南植物志 3: 327, 图 748. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 329, 图 5892. 1975。

灌木或小乔木，高1—4米，全株无毛，干时常变黑色或暗褐色；小枝的节间短，节稍膨大，嫩枝和嫩叶有胶状物质。叶革质，倒卵圆形或阔椭圆形，长2.5—7.5厘米，宽1.5—4.5厘米，顶端圆形，基部楔形，常下延，上面常有光泽；侧脉4—6对，纤细，在两面均不明显；叶柄长0.5—1.5厘米；托叶合生成短筒状，长约3毫米，早落。花序腋生，有花多朵，长1.5—3厘米，宽2—2.5厘米，总花梗长0.5—1厘米；花白色或淡黄色，花梗长1—2毫米；萼管长约5毫米，萼檐长约1.5毫米，顶端近截平或稍具钝小齿；花冠管长4—5毫米，喉部被毛，裂片长约2毫米，顶端钝；花丝短，花药长约2.5毫米，稍伸出；花柱长约5毫米，柱头广展。核果长8—11毫米，直径3—5毫米，有明显的纵棱6—8条，顶部冠以宿存的萼檐。花期7—11月，果期8—12月。

产于海南琼山、文昌、万宁、崖县；生于海拔5—20米处的海边泥滩上。分布同