

侧脉 6—7 对 15. 华南乌口树 *T. austrosinensis* Chun et How ex W. C. Chen

1. 种子 1—2 颗; 子房每室有胚珠 1 颗。

16. 叶上面无毛; 花梗几无或长 2—5 毫米 16. 假桂乌口树 *T. attenuata* (Voigt) Hutchins.

16. 叶上面被疏糙伏毛; 花梗长 1.8—3 厘米 17. 长梗乌口树 *T. sinica* W. C. Chen

1. 广西乌口树 (植物分类报) 图版 98: 12—13

Tarenna lanceolata Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 139, fig. 1. 1984.

灌木, 高 0.5—3 米; 嫩枝被短柔毛, 老枝无毛, 常呈棕红色。叶纸质, 披针形, 长 5—32.5 厘米, 宽 1—5 厘米, 顶端长渐尖, 基部短尖或楔形, 上面稍粗糙, 被疏糙伏毛, 下面被短柔毛, 在两面中脉上均被硬毛; 中脉和侧脉在叶下面均凸起, 侧脉 7—10 对, 弯拱上升; 叶柄长 0.3—1.8 厘米, 被硬毛; 托叶披针形, 长 6—10 毫米, 被硬毛。花序 (果时) 顶生, 长约 2 厘米, 宽约 3 厘米, 被硬毛; 花未见。果近球形, 直径 3—6 毫米, 被短柔毛或无毛, 顶部常有宿存萼裂片; 宿存萼裂片钻状, 长 4—5 毫米, 被硬毛; 种子 8—32 颗。果期 5—11 月。

产于广西融水、金秀、龙胜和临桂, 湖南洞口, 贵州凯里、榕江; 生于海拔 750—1 520 米处的山谷林中或灌丛中。模式标本采自广西融水县九万大山。

2. 白皮乌口树 (中国高等植物图鉴) 白骨木 (中国经济植物志)

Tarenna depauperata Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 411. 1916; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1020. 1936; Li in Journ. Arn. Arb. **25**: 318. 1944; 中国高等植物图鉴 **4**: 231, 图 5876. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1273. 1984.

灌木或小乔木, 高 1—6 米; 枝淡黄白色或灰白色, 光滑, 嫩枝干后变黑色。叶纸质或革质, 椭圆状倒卵形、椭圆形或近卵形, 长 4—15 厘米, 宽 2—6.5 厘米, 顶端短渐尖或骤然渐尖, 尖端常稍钝, 基部楔形或短尖, 两面无毛, 干后变为黑褐色, 上面稍光亮, 下面有时呈黄褐色; 中脉在两面凸起, 侧脉 5—11 对, 纤细, 在两面稍凸起; 叶柄长 4—18 毫米; 托叶三角状卵形, 长 4—5 毫米, 无毛, 脱落。伞房状的聚伞花序顶生, 少花或多花, 总花梗长约 1 厘米, 无毛或被微柔毛; 苞片三角形, 长 1—1.5 毫米, 内面有短柔毛; 花梗长约 3 毫米; 花萼无毛或被微柔毛, 萼管长约 2 毫米, 裂片卵形或三角形, 有细缘毛, 长 0.75 毫米; 花冠白色, 长 7.5—10 毫米, 外面无毛, 内面有长柔毛, 裂片 5, 长圆形, 比冠管稍长; 花药线状长圆形, 长 3—4 毫米, 伸出; 花柱下部有短柔毛, 柱头伸出, 胚珠每室 1—3 颗。浆果球形, 成熟时黑色, 光亮, 直径 6—8 毫米, 有种子 1 或 2 颗。花期 4—11 月, 果期 4 月至翌年 1 月。

产于江苏、湖南、广东、广西、贵州、云南; 生于海拔 200—1 640 米处的山地、丘陵或溪边的林中和灌丛中, 常见于石山上。国外分布于越南。模式标本采自云南蒙自。



图版 98 1—7. 滇南乌口树 *Tarennia pubinervis* Hutchins.: 1. 果枝; 2. 花序; 3. 花; 4. 雄蕊; 5. 花柱和柱头; 6. 子房横切面; 7. 果。8—11. 披针叶乌口树 *Tarennia lancilimba* W. C. Chen: 8. 花枝; 9. 花蕾; 10. 花; 11. 果。12—13. 广西乌口树 *Tarennia lanceolata* Chun et How ex W. C. Chen: 12. 果枝; 13. 果。(黄少容绘)