

侧脉 6—7 对 15. 华南乌口树 *T. austrosinensis* Chun et How ex W. C. Chen

1. 种子 1—2 颗; 子房每室有胚珠 1 颗。

16. 叶上面无毛; 花梗几无或长 2—5 毫米 16. 假桂乌口树 *T. attenuata* (Voigt) Hutchins.

16. 叶上面被疏糙伏毛; 花梗长 1.8—3 厘米 17. 长梗乌口树 *T. sinica* W. C. Chen

1. 广西乌口树 (植物分类报) 图版 98: 12—13

Tarennia lanceolata Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 139, fig. 1. 1984.

灌木, 高 0.5—3 米; 嫩枝被短柔毛, 老枝无毛, 常呈棕红色。叶纸质, 披针形, 长 5—32.5 厘米, 宽 1—5 厘米, 顶端长渐尖, 基部短尖或楔形, 上面稍粗糙, 被疏糙伏毛, 下面被短柔毛, 在两面中脉上均被硬毛; 中脉和侧脉在叶下面均凸起, 侧脉 7—10 对, 弯拱上升; 叶柄长 0.3—1.8 厘米, 被硬毛; 托叶披针形, 长 6—10 毫米, 被硬毛。花序 (果时) 顶生, 长约 2 厘米, 宽约 3 厘米, 被硬毛; 花未见。果近球形, 直径 3—6 毫米, 被短柔毛或无毛, 顶部常有宿存萼裂片; 宿存萼裂片钻状, 长 4—5 毫米, 被硬毛; 种子 8—32 颗。 果期 5—11 月。

产于广西融水、金秀、龙胜和临桂, 湖南洞口, 贵州凯里、榕江; 生于海拔 750—1 520 米处的山谷林中或灌丛中。模式标本采自广西融水县九万大山。

2. 白皮乌口树 (中国高等植物图鉴) 白骨木 (中国经济植物志)

Tarennia depauperata Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 411. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7** (4): 1020. 1936; Li in Journ. Arn. Arb. **25**: 318. 1944; 中国高等植物图鉴 **4**: 231, 图 5876. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1273. 1984.

灌木或小乔木, 高 1—6 米; 枝淡黄白色或灰白色, 光滑, 嫩枝干后变黑色。叶纸质或革质, 椭圆状倒卵形、椭圆形或近卵形, 长 4—15 厘米, 宽 2—6.5 厘米, 顶端短渐尖或骤然渐尖, 尖端常稍钝, 基部楔形或短尖, 两面无毛, 干后变为黑褐色, 上面稍光亮, 下面有时呈黄褐色; 中脉在两面凸起, 侧脉 5—11 对, 纤细, 在两面稍凸起; 叶柄长 4—18 毫米; 托叶三角状卵形, 长 4—5 毫米, 无毛, 脱落。伞房状的聚伞花序顶生, 少花或多花, 总花梗长约 1 厘米, 无毛或被微柔毛; 苞片三角形, 长 1—1.5 毫米, 内面有短柔毛; 花梗长约 3 毫米; 花萼无毛或被微柔毛, 萼管长约 2 毫米, 裂片卵形或三角形, 有细缘毛, 长 0.75 毫米; 花冠白色, 长 7.5—10 毫米, 外面无毛, 内面有长柔毛, 裂片 5, 长圆形, 比冠管稍长; 花药线状长圆形, 长 3—4 毫米, 伸出; 花柱下部有短柔毛, 柱头伸出, 胚珠每室 1—3 颗。浆果球形, 成熟时黑色, 光亮, 直径 6—8 毫米, 有种子 1 或 2 颗。 花期 4—11 月, 果期 4 月至翌年 1 月。

产于江苏、湖南、广东、广西、贵州、云南; 生于海拔 200—1 640 米处的山地、丘陵或溪边的林中和灌丛中, 常见于石山上。国外分布于越南。模式标本采自云南蒙自。

种子含油量 29.86%；油可供药用，亦可供制肥皂和润滑油。

3. 宽序乌口树 (植物分类学报)

Tarennia laticorymbosa Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 141, fig. 2. 1984.

灌木；小枝无毛。叶膜质或纸质，长圆形或倒卵状长圆形，长 18.5—25 厘米，宽 6—10 厘米，顶端渐尖或钝圆而有短尖头，基部楔形，干时灰黑色，两面无毛；侧脉 8—13 对，近边缘网结，在上面稍凹下，在下面凸起；叶柄长 2.5—3.5 厘米，无毛；托叶卵状三角形，无毛。伞房状的聚伞花序顶生，大，广展，长约 15 厘米，宽约 20 厘米，近无毛或被微细的短柔毛；小苞片极微小；花梗长 3—8 毫米，被微细的短柔毛；花萼倒圆锥形，长约 2 毫米，被粉状的短柔毛，顶部具小齿，基部渐狭；花冠管狭，长 6.5 毫米，外面无毛，裂片 5，线状长圆形，较管稍长，宽 1.5 毫米，顶部圆形，外面无毛，近基部内面被疏柔毛；花药线形，长约 8 毫米；花柱纤细，连柱头长约 18 毫米，中部以下被疏柔毛，胚珠每室 4 颗。果未见。花期 5 月。

产于云南河口。模式标本采自云南河口。

4. 锡兰玉心花 (台湾植物志)

Tarennia zeylanica Gaertn. Fruct. 1: 139, t. 28. fig. 3. 1788; Li, Woody Fl. Taiwan 873. 1963; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 336. 1978. — *Chomelia kotoensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. **9**: 58. 1920. — *T. kotoensis* (Hayata) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **22**: 462. 1932; Kanehira, Formos. Trees ed. 2. 682, fig. 638. 1936.

常绿灌木；小枝无毛。叶纸质，长圆状卵形至长圆状倒卵形或长圆形，长 13—22 厘米，宽 5—12 厘米，顶端短骤尖或短尖，基部楔形，两面无毛；侧脉 7—8 对，在下面明显；叶柄长 2—5 厘米，无毛；托叶基部合生，三角形，长 3—10 毫米。伞房状的聚伞花序顶生，长约 10 厘米，宽约 15 厘米，无毛；苞片线形，长 2—3 毫米；花萼管状，顶端 5 齿裂，无毛；花冠漏斗状，白色，长约 12 毫米，内面被柔毛，裂片 5，长圆形，顶端钝圆，长约 8 毫米，宽约 3 毫米；雄蕊伸出，花丝极短，花药线形，长 0.8—1 厘米；花柱伸出，长约 1.6 厘米，下部被柔毛，柱头头状，有时 2 裂，子房每室有胚珠 2 颗。浆果球形，成熟时黑色，直径约 1 厘米，无毛，具 2—4 颗种子。

产于台湾恒春和兰屿；生于海拔 500 米以下的林中。国外分布于日本、斯里兰卡。

5. 披针叶乌口树 (植物分类学报) 图版 98: 8—11

Tarennia lancilimba W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 141, fig. 3. 1984. — *T. attenuata* (Voigt) Hutchins. var. *puberula* Chun et How ap. Ko in Fl. Hainan. **3**: 584. 1974.

灌木或乔木，高 2—10 (—15) 米；小枝稍压扁，无毛或被粉状短柔毛。叶薄革