

种子含油量 29.86%；油可供药用，亦可供制肥皂和润滑油。

3. 宽序乌口树 (植物分类学报)

Tarennia laticorymbosa Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 141, fig. 2. 1984.

灌木；小枝无毛。叶膜质或纸质，长圆形或倒卵状长圆形，长 18.5—25 厘米，宽 6—10 厘米，顶端渐尖或钝圆而有短尖头，基部楔形，干时灰黑色，两面无毛；侧脉 8—13 对，近边缘网结，在上面稍凹下，在下面凸起；叶柄长 2.5—3.5 厘米，无毛；托叶卵状三角形，无毛。伞房状的聚伞花序顶生，大，广展，长约 15 厘米，宽约 20 厘米，近无毛或被微细的短柔毛；小苞片极微小；花梗长 3—8 毫米，被微细的短柔毛；花萼倒圆锥形，长约 2 毫米，被粉状的短柔毛，顶部具小齿，基部渐狭；花冠管狭，长 6.5 毫米，外面无毛，裂片 5，线状长圆形，较管稍长，宽 1.5 毫米，顶部圆形，外面无毛，近基部内面被疏柔毛；花药线形，长约 8 毫米；花柱纤细，连柱头长约 18 毫米，中部以下被疏柔毛，胚珠每室 4 颗。果未见。花期 5 月。

产于云南河口。模式标本采自云南河口。

4. 锡兰玉心花 (台湾植物志)

Tarennia zeylanica Gaertn. Fruct. 1: 139, t. 28. fig. 3. 1788; Li, Woody Fl. Taiwan 873. 1963; J. M. Chao in Li, Fl. Taiwan **4**: 336. 1978. — *Chomelia kotoensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. **9**: 58. 1920. — *T. kotoensis* (Hayata) Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa **22**: 462. 1932; Kanehira, Formos. Trees ed. 2. 682, fig. 638. 1936.

常绿灌木；小枝无毛。叶纸质，长圆状卵形至长圆状倒卵形或长圆形，长 13—22 厘米，宽 5—12 厘米，顶端短骤尖或短尖，基部楔形，两面无毛；侧脉 7—8 对，在下面明显；叶柄长 2—5 厘米，无毛；托叶基部合生，三角形，长 3—10 毫米。伞房状的聚伞花序顶生，长约 10 厘米，宽约 15 厘米，无毛；苞片线形，长 2—3 毫米；花萼管状，顶端 5 齿裂，无毛；花冠漏斗状，白色，长约 12 毫米，内面被柔毛，裂片 5，长圆形，顶端钝圆，长约 8 毫米，宽约 3 毫米；雄蕊伸出，花丝极短，花药线形，长 0.8—1 厘米；花柱伸出，长约 1.6 厘米，下部被柔毛，柱头头状，有时 2 裂，子房每室有胚珠 2 颗。浆果球形，成熟时黑色，直径约 1 厘米，无毛，具 2—4 颗种子。

产于台湾恒春和兰屿；生于海拔 500 米以下的林中。国外分布于日本、斯里兰卡。

5. 披针叶乌口树 (植物分类学报) 图版 98: 8—11

Tarennia lancilimba W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 141, fig. 3. 1984. — *T. attenuata* (Voigt) Hutchins. var. *puberula* Chun et How ap. Ko in Fl. Hainan. **3**: 584. 1974.

灌木或乔木，高 2—10 (—15) 米；小枝稍压扁，无毛或被粉状短柔毛。叶薄革

质，披针形、椭圆形或倒卵状长圆形，长 5—15 厘米，宽 1.5—5 厘米，顶端短渐尖，基部楔形，稍下延，干时淡黑褐色，下面稍黄，两面无毛；中脉在上面稍凹下，在下面凸起，侧脉 4—6 对，纤细，不明显或稍明显；叶柄长 8—20 毫米，无毛；托叶三角形，长约 3 毫米，无毛。伞房状的聚伞花序顶生，多花，三歧分枝，长宽约 4—9 厘米，近无毛或被粉状短柔毛；苞片和小苞片微小；花香，花梗长 3—6 毫米；花萼无毛或被短柔毛，长约 2.5 毫米，裂片 5，长约 0.7 毫米，有小缘毛；花冠白色，冠管纤细，长 5—7 毫米，外面无毛，喉部有疏柔毛，裂片 5，舌状线形，比冠管稍长，顶端钝，内面近基部有疏柔毛；花药线形，长约 7 毫米；花柱纤细，长 17—20 毫米，中部以下被疏柔毛，胚珠每室 2 颗。浆果球形，直径 5—6 毫米，干时黑色；种子 2—4 颗。花期 4—6 月，果期 6 月至翌年 1 月。

产于海南东方、崖县、乐东、白沙、保亭、陵水和万宁，广西上思；生于海拔 130—970 米处的山地林中和灌丛中。国外分布于越南。模式标本采自海南东方县感城黄婆坡黎村之北。

6. 滇南乌口树 (中国高等植物图鉴) 毛脉乌口树 (广西植物名录) 图版 98: 1—7

Tarenna pubinervis Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 411. 1916; 中国高等植物图鉴 4: 233. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1273. 1984.

灌木或小乔木，高 0.5—6 米；嫩枝有极短的柔毛。叶纸质或膜质，长圆状椭圆形、长圆状披针形、披针形或倒披针形，长 6—22 厘米，宽 2—7.8 厘米，顶端尾状渐尖或渐尖，基部渐狭或短尖，干时黑褐色，两面散生短柔毛或近无毛，在中脉和侧脉上毛常较密，常有缘毛；侧脉 7—10 对，在下面微凸起；叶柄长 5—25 毫米，有短柔毛；托叶三角形，长 5—9 毫米，顶端长渐尖，无毛。聚伞花序顶生，少花，长约 3 厘米，宽约 3.5 厘米；苞片线形，长 1.5—2 毫米，有短柔毛；花梗长约 2.5 毫米，有短柔毛；花萼长 3—3.5 毫米，无毛或有疏短柔毛，裂片披针形，长 1—1.75 毫米，有缘毛；花冠淡绿色，长约 1 厘米，外面无毛，内面有柔毛，冠管与裂片近等长或稍短于裂片，长 4—5 毫米，裂片 5，长圆形，顶端钝；花药伸出，线形，长 5—6 毫米；花柱下部有柔毛，柱头伸出。果狭椭圆形或近球形，长 5—10 毫米，直径 3—5 毫米，干时黑色，无毛，果柄有柔毛；种子 1—6 颗。花期 3—5 月，果期 6 月至翌年 1 月。

产于广西凌云和龙胜，云南广南、富宁、西畴、文山、麻栗坡、马关、河口、屏边、蒙自和绿春，四川达县和珙县，重庆；生于海拔 700—2 640 米处的山谷林中。国外分布于越南。模式标本采自云南绿春逢春岭。

7. 崖州乌口树 (中国高等植物图鉴) 毛冠乌口树 (海南植物志) 图版 99: 11—14

Tarenna laui Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 59. 1935; 海南植物志 3: 319.



图版 98 1—7. 滇南乌口树 *Tarennia pubinervis* Hutchins.: 1. 果枝; 2. 花序; 3. 花; 4. 雄蕊; 5. 花柱和柱头; 6. 子房横切面; 7. 果。8—11. 披针叶乌口树 *Tarennia lancilimba* W. C. Chen: 8. 花枝; 9. 花蕾; 10. 花; 11. 果。12—13. 广西乌口树 *Tarennia lanceolata* Chun et How ex W. C. Chen: 12. 果枝; 13. 果。(黄少容绘)