

厘米，宽2—4.5厘米，顶端渐尖，基部楔形，上面无毛，下面被疏的紧贴的短硬毛，在脉上较密；侧脉6—7对，纤细，在下面稍明显；叶柄长0.5—1.5厘米，被紧贴的硬毛；托叶三角形，长2毫米，具凸尖，有硬毛或无毛。伞房状的聚伞花序顶生，长5—6厘米，宽约10厘米，三歧分枝，被柔毛；花梗纤细，长0.5—1厘米，被柔毛；小苞片1—2枚，微小，有毛；花萼被柔毛，长2.5—3.5毫米，檐部扩大，顶端5裂片阔三角形，长约0.5毫米；花冠高脚碟状，白色，外面无毛，喉部有长柔毛，冠管长约6毫米，宽约1.5毫米，内面有硬毛，裂片5，匙状长圆形，长约1厘米，宽约3毫米，无毛；花丝短，长约2毫米，无毛，花药线形，长约1厘米，伸出；花柱长1.5—2厘米，伸出，下部有硬毛，顶部短2裂或不裂，子房每室有胚珠5—6颗。浆果椭圆形，直径约5毫米，无毛，成熟时黑色，果柄纤细，长约1厘米。 花、果期夏秋。

产于台湾中部和南部；生于海拔500—2500米处的山地林中。模式标本采自台湾阿猴。

11. 海南乌口树 (中国高等植物图鉴) 光冠乌口树 (海南植物志)

Tarenna tsangii Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* 11: 59. 1932; 海南植物志 3: 319. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 233, 图 5879. 1975.

11a. 海南乌口树 (原变型) 图版 99: 1—5

f. *tsangii*

灌木或乔木，高1—6米，小枝被极短的柔毛。叶纸质，长圆状倒卵形或倒披针形，长6—26厘米，宽1.5—7厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部楔形，干时呈黑褐色，上面无毛，下面散生近乳突状的短柔毛或近无毛，常稍粗糙，在脉上被毛稍长和较密；侧脉4—7对，弯拱上升，疏离，纤细，在下面稍明显；叶柄长5—15毫米，有短柔毛；托叶三角形，渐尖，长4—5毫米。伞房状的聚伞花序顶生，长4—7厘米，宽约6厘米，多花，被紧贴的灰色短柔毛；花梗长4—7毫米，与花萼均被短柔毛；萼管圆筒状壶形，长约3毫米，顶端5浅裂，裂片三角形，长0.3—0.5毫米；花冠白色，长1.8—1.9厘米，外面无毛，内面被柔毛，5裂，裂片长圆形，长约1厘米，宽约2毫米，比冠管稍长或近等长，开放时外反；雄蕊5枚，花丝长约1毫米，花药线形，常旋卷，长约8毫米；花柱长约2厘米，伸出花冠，上部无毛，下部有柔毛，子房2室，每室有2颗并列的胚珠。果近球形，直径5—7毫米，无毛，果柄长约5毫米，有种子4颗。 花期5—7月，果期7月至翌年1月。

产于广东茂名，广西南部 and 海南乐东、崖县、保亭、琼中、万宁和定安；生于海拔140—800米处的山地林中。模式标本采自海南琼中县红毛山。

11b. 椭圆叶乌口树 (变型) (海南植物志)

f. *elliptica* Chun et How ap. Ko in *Fl. Hainan.* 3: 584. 319. 1974.

本变型与原变型不同之处在于叶呈椭圆形或卵状椭圆形，长5—8厘米，宽3—6厘