

米。 果期 12 月。

产于海南陵水；生于海拔 860 米处的荫蔽山坡湿润的草地上，极少见。模式标本采自海南陵水县吊罗山。

12. 云南乌口树 (植物分类学报) 图版 100: 6—11

*Tarenna yunnanensis* How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica 22 (2): 142, fig. 4. 1984.

灌木或乔木；小枝，叶柄、花序均密被黄褐色长柔毛。叶纸质，椭圆形、长圆形或倒披针状长圆形，长 11—32 厘米，宽 3.5—12 厘米，顶端骤然短渐尖，基部楔形或短尖，上面近无毛或散生短硬毛，在中脉和侧脉上被毛较密，下面密被柔毛；侧脉 8—12 对，弯拱上升，在下面凸起；叶柄长 0.5—2.3 厘米。花序顶生，长 4—9 厘米，宽 4—7 厘米；花梗长 2—3 毫米；萼管杯状，长 2—2.5 毫米，裂片狭三角形，长约 1 毫米；花冠长 1—1.2 厘米，外面密被黄褐色柔毛，喉部有疏短柔毛，裂片长圆形，较管短；花药线形，长约 5 毫米；花柱有疏短柔毛，柱头伸出，胚珠每室 3—5 颗。果近球形，被黄褐色长柔毛，直径约 5 毫米。 花期 4—6 月，果期 6 月。

产于云南河口和金平；生于海拔 180—200 米处的山谷林中、灌丛中或溪边。模式标本采自云南河口。

13. 尖萼乌口树 (中国高等植物图鉴) 图版 100: 1—5

*Tarenna acutisepala* How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica 24 (6): 477. 1986. — *T. pubinervis* auct. non Hutchins. (1916): Merr. in Lingnan Sci. Journ. 15: 427. 1936, quoad specimen W. T. Tsang 20760.

灌木，高 1—2.5 米；嫩枝灰色，被短硬毛，稍老时毛和表皮一起脱落而呈红褐色。叶纸质或近革质，长圆形或披针形，少为长圆状椭圆形或近卵形，长 4—19.5 厘米，宽 1.5—5.6 厘米，顶端渐尖或短尖，基部楔形、稍钝或短尖，上面无毛或沿中脉被疏短柔毛，罕有极疏的短伏毛，下面被短柔毛或乳突状毛，有时无毛；侧脉较疏，纤细，5—7 对；叶柄长 5—22 毫米，有短硬毛；托叶三角形，长约 6 毫米，锐尖，外面在中肋和基部被短硬毛。伞房状的聚伞花序顶生，有花数至多朵，紧密，长 2.5—3 厘米，宽约 4 厘米，总花梗通常短，有短柔毛；小苞片披针形，长 1.5—2 毫米，有短柔毛；花梗长 2—3 毫米，有短柔毛；花萼长 4 毫米，外面有短柔毛，萼管卵形，萼裂片三角状披针形，长约 1.5 毫米，顶端尖；花冠淡黄色，长约 1.4 厘米，外面无毛，冠管内面上部和喉部有柔毛，花冠裂片椭圆形，长约 4 毫米；花药线状长圆形，长 3 毫米；花柱丝状，长约 1.5 厘米，中部以上有柔毛，柱头伸出，胚珠每室 16—20 颗。浆果近球形，直径 5—7 毫米，有短柔毛或无毛，顶部常有宿存的萼裂片；种子 9—31 颗。 花期 4—9 月，果期 5—11 月。

产于江苏、江西、福建、湖南、广东、广西、四川；生于海拔 520—1 530 米处的



图版 100 1—5. 尖萼乌口树 *Tarenna acutisepala* How ex W. C. Chen: 1. 花枝; 2. 花; 3. 部分花冠展开, 示雄蕊; 4. 花萼和雌蕊, 示胚珠; 5. 果。6—11. 云南乌口树 *Tarenna yunnanensis* How ex W. C. Chen: 6. 花枝; 7. 花蕾; 8. 雄蕊正面; 9. 雄蕊背面; 10. 部分花萼和雌蕊, 示子房纵切面; 11. 果。12—15. 假桂乌口树 *Tarenna attenuata* (Voigt) Hutchins.: 12. 花枝; 13. 花; 14. 子房横切面; 15. 果。(黄少容绘)