

山坡或山谷溪边林中或灌丛中。模式标本采自广东北江姐婆山。

14. 多籽乌口树 (植物分类学报)

Tarennia polysperma Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 144, fig. 6. 1984.

灌木或乔木，高 1.5—14 米；小枝稍扁，无毛。叶革质，长圆状披针形或椭圆形，长 5—10.5 厘米，宽 1.5—3.8 厘米，顶端短渐尖或骤然短尖，基部楔形，干时橄榄绿褐色，两面无毛；侧脉 7—9 对，纤细，在两面稍明显；叶柄长 5—15 毫米，无毛；托叶三角状钻形，长约 4 毫米，脱落。伞房状的聚伞花序顶生，三歧分枝，有 6—10 朵花，长约 3 厘米，宽约 4 厘米，近无毛；总花梗短，长 5—10 毫米；苞片和小苞片丝状，长 1—2 毫米，具小缘毛；花香，花梗长 3.5—6.5 毫米；花萼无毛，萼管陀螺形，长约 2.5 毫米，裂片阔三角形，长约 0.5 毫米；花冠白色，长约 1.2 厘米，外面无毛，喉部被长柔毛，裂片卵形，长约 4.5 毫米，比冠管短；花药线形，花丝短；柱头被疏柔毛，胚珠每室约 17 颗。浆果球形，直径约 7 毫米，无毛，有种子 14—27 颗。花期 3—4 月，果期 5—10 月。

产于广东从化和龙门；生于海拔 930—1 000 米处的山地林中。模式标本采自广东从化县三角山。

15. 华南乌口树 (植物分类学报)

Tarennia austrosinensis Chun et How ex W. C. Chen in Acta Phytotax. Sinica **22** (2): 145, fig. 7. 1984.

灌木，高约 2 米；枝和小枝圆柱形，无毛。叶纸质或膜质，长圆形或长圆状披针形，长 5—15 厘米，宽 2—4.5 厘米，顶端渐尖，基部楔形，两面无毛或下面被极疏的短柔毛，干时淡黑褐色；中脉在上面平，在下面凸起，侧脉 6—7 对，纤细，稍明显，在边缘内网结；叶柄长 5—15 毫米，无毛；托叶卵状渐尖，长 4—5 毫米，无毛，脱落。伞房状的聚伞花序顶生，长约 3 厘米，少花，被短柔毛；小苞片微小，丝状，长 1—2 毫米，被短柔毛；花梗长 3—5 毫米，被短柔毛；萼管长 1.5—2 毫米，被疏短柔毛，裂片三角形，顶端尖，长 0.8—1.5 毫米，无毛；花冠淡绿色，冠管长约 7 毫米，外面无毛，内面有长柔毛，喉部有须毛，裂片 5，卵形，长 3—4 毫米，顶端短尖；花药线形，长约 3 毫米；花柱长约 10 毫米，中部有疏柔毛，胚珠每室 6—9 颗。浆果球形，直径 5—6 毫米，有种子 6—14 颗。花期 4—5 月，果期 8—9 月。

产于广东信宜，广西金秀，湖南宜章；生于海拔 860—1 300 米处的山地林中。模式标本采自广东信宜县分水坳平河。

16. 假桂乌口树 (广西植物名录) 树节 (广东海康) 图版 100: 12—15

Tarennia attenuata (Voigt) Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 411. 1916; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. **13**: 160. 1918; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **6**: 331.