

花柱丝形，弯曲，柱头棒形，2裂；胚珠每室1颗，由顶端下垂。果圆柱形，有2槽；种子每室单颗，种皮革质，无胚乳，胚线状倒披针形。

我国特有属，1种，产于四川和云南。

1. 丁茜（中国高等植物图鉴） 图版 1

Trailliaedoxa gracilis W. W. Smith et Forrest in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 10: 75. 1917; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 238. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin 7(4): 1022. 1936; 中国高等植物图鉴 4: 259, 图 5932. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1274. 1984.

直立亚灌木，多分枝，高20—45厘米，间有达60厘米，基部木质；茎纤细，稠密，圆柱形，密被微细卷毛，老时毛脱落近无毛。叶革质，倒卵形或倒披针形，长5—10毫米，宽3—4毫米，顶端圆或钝，基部渐狭成1柄，全缘，上面无毛或被疏毛，下面色较淡，沿中脉被长毛，其余无毛或被微柔毛，两面叶脉均不明显；叶柄极短，长不及1毫米；托叶锥形，2裂，长约6毫米，被微柔毛。花序近球形，长约5毫米，宽8毫米，有花6—12朵，被曲卷毛并有长约5毫米的总花梗和微小、线形的苞片；花梗长1—2毫米，被长毛；萼管长约1毫米，被浓密钩毛，萼檐裂片线形，长0.8毫米，短尖，基部略收缩；花冠红白色或浅黄色，延长漏斗形，长约2毫米，宽0.75毫米。果密被钩毛，顶部冠以宿存萼檐裂片。 花期末详。

产四川和云南（金沙江及其支流）。生于干暖河谷两旁的岩石中和山坡草丛中。模式标本采自云南丽江虎跳峡大具。

族 9. 红芽大戟族 Trib. 9. Knoxieae Hook. f.

Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 2: 9, 21. 1873; K.

Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 89. 1891;

S. P. Darwin in Taxon 25 (5/6): 604. 1976.


草本或亚灌木。叶对生；托叶与叶柄合生成一短鞘。花冠裂片镊合状排列；雄蕊着生在花冠喉部；子房2室，花柱丝形，顶端2裂；珠孔向上；胚珠悬垂于子房室顶，珠柄不增厚。果干燥，具2分果片，易破碎；种子在背部压扁，胚乳丰富，具向上的胚根。

模式属：红芽大戟属 *Knoxia* Linn.

本族约有2属、40种，分布于旧大陆的热带地区。我国有1属、3种。

60. 红芽大戟属 *Knoxia* Linn.

Linn. Sp. Pl. 104. 1753; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen.



图版 1 丁茜 *Trailliaedoxa gracilis* W. W. Smith et Forrest: 1. 花枝; 2. 聚伞花序; 3. 花; 4. 花冠展开;
5. 雌蕊; 6. 茎一段, 示托叶; 7、8. 叶。(余汉平绘)