

本属约 11 种，分布于非洲和亚洲热带地区。我国产 1 种，分布广东和海南等省。

本属与鱼骨木属 *Canthium* 极相似，其不同之处在于子房 3—6 室通常 5 室，核果有小核 3—5 个。

1. 琼梅 (海南植物志) 图版 3

Meyna hainanensis Merr. in Lingnan Sci. Journ. **14**: 57. 1935; 海南植物志 **3**: 340, 图 758. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 256, 图 5925. 1975.

乔木或小乔木，高 3—6 米，无毛或近无毛；小枝对生，圆柱形，紫褐色，具散生的皮孔，生叶的小枝极短，粗壮，长 0.5—1 厘米，直径 5 毫米，覆盖着很多鳞片。叶纸质或近膜质，卵形或长卵形或长圆形，长 3—5 (—9) 厘米，宽 2—2.5 (—5) 厘米，顶端急尖或渐尖，基部阔楔尖或近圆形，两面无毛，仅脉腋内有小束毛；叶柄纤细，长 5—8 毫米，无毛，干后两侧腹卷；托叶脱落，披针形，渐尖，长 2—5 毫米。花 5 或 4 数，有花梗，梗纤细，长 4—6 毫米，被毛，果时毛脱落；萼管倒圆锥形，长约 0.5 毫米，被疏毛，萼檐裂片三角状披针形，长 0.8 毫米，顶端长尖；花冠管阔圆筒形，长约 3 毫米，外面无毛，裂片披针形，约与冠管等长，广展，顶端长渐尖；花丝缺，花药顶端钝，稍突出；子房 3 或 4 室，花柱无毛，略长于冠管。核果球形，直径 8—10 毫米，有小核 3 或 4 颗，顶冠以微小的宿存萼檐。花期 4—8 月。

产海南的三亚、乐东。生于杂木林的，少见。模式标本采自海南三亚。

62. 鱼骨木属* *Canthium* Lam.

Lam. Encycl. **1**: 602. 1785.

灌木或乔木，具刺或无刺。叶对生，具短柄；托叶生在叶柄间，三角形，基部合生。花小，腋生，簇生或排成伞房花序式的聚伞花序；萼管短，半球形或倒圆锥形，萼檐极短，截平或 4—5 浅裂，常常脱落；花冠管短或延长，瓮形，漏斗形或近球形，里面常常具 1 环倒生毛，顶部 4—5 裂，裂片卵状三角形，镊合状排列，花后外弯；雄蕊与花冠裂片同数，着生于冠管喉部，花丝短或无，花药近基部背着；花盘环形；子房 2 室，每室有下垂胚珠 1 颗，花柱粗厚，内藏或长突出，柱头 2 裂或全缘。核果近球形，罕有孪生，有时因其中一个心皮的发育受抑制呈肾形，内有小核 1—2 个；小核骨质或脆壳质；种子长圆形，圆柱形或平凸形，种皮膜质，胚乳肉质，胚根向上。

属模式：C. parviflorum Lam.

本属约 50 余种，广布于亚洲热带地区、非洲和大洋洲。我国产 3 种，1 变种，主要分布南部和西南部。

* 属的异名：步散属 (中国树木分类学)

据台湾有关文献载, 台湾兰屿尚有 *C. gynochthodes* Bail.; 因未见标本, 本志未录。

分种检索表

1. 植物具刺; 核果卵形, 长 15—25 毫米, 直径 10—20 毫米; 叶长 2—3 (5) 厘米, 宽 1—2 厘米 …………… 1. 猪肚木 *C. horridum* Bl.
 1. 植物无刺; 核果多型。
 2. 叶纸质, 卵状长圆形, 长 9—13 厘米, 宽 4.5—6.5 厘米; 聚伞花序有明显的总花梗; 核果长 10—15 (20) 毫米, 直径 9—11 (15) 毫米 …………… 2. 大叶鱼骨木 *C. simile* Merr. et Chun
 2. 叶革质, 干后有光泽; 核果较小。
 3. 叶卵形, 椭圆形至卵状披针形, 长 4—10 厘米, 宽 1.5—4 厘米; 花排成聚伞花序; 果倒卵形或倒卵状椭圆形 …………… 3. 鱼骨木 *C. dicoccum* (Gaertn.) Teysmann et Binnedijk
 3. 叶倒卵形或倒卵状椭圆形, 长 3.3—9 厘米, 宽 2.6—5 厘米; 花 4—6 朵成束, 簇生于叶腋内; 果近球形或椭圆形 …………… 3a. 倒卵叶鱼骨木 var. *obovalifolium* G. A. Fu
1. 猪肚木 (广东) 猪肚筋 (海南澄迈)

Canthium horridum Bl. Bijdr. 966. 1826; Merr. et Chun in Sunyatsenina 2: 46. 1934; 海南植物志 3: 356. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 268, 图 5949, 1975. — *C. parvifolium* auct. non Roxb.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 385. 1888.

灌木, 高 2—3 米, 具刺; 小枝纤细, 圆柱形, 被紧贴土黄色柔毛; 刺长 3—30 毫米, 对生, 劲直, 锐尖。叶纸质, 卵形, 椭圆形或长卵形, 长 2—3 (—5) 厘米, 宽 1—2 厘米, 顶端钝、急尖或近渐尖, 基部圆或阔楔形, 无毛或沿中脉略被柔毛; 侧脉每边 2—3 条, 纤细, 在叶下面稍明显; 叶柄短, 长 2—3 毫米, 略被柔毛; 托叶长 2—3 毫米, 被毛。花小, 具短梗或无花梗, 单生或数朵簇生于叶腋内; 小苞片杯形, 生于花梗顶部; 萼管倒圆锥形, 长 1—1.5 毫米, 萼檐顶部有不明显波状小齿; 花冠白色, 近瓮形, 冠管短, 长约 2 毫米, 外面无毛, 喉部有倒生髯毛, 顶部 5 裂, 裂片长圆形, 长约 3 毫米, 顶端锐尖; 花丝短, 花药内藏或微突出, 长约 5 毫米, 基部被柔毛; 柱头橄榄形, 粗糙。核果卵形, 单生或孪生, 长 15—25 毫米, 直径 10—20 毫米, 顶部有微小宿存萼檐, 内有小核 1—2 个; 小核具不明显小瘤状体。花期 4—6 月。

产广东、香港、海南、广西、云南。生于低海拔的灌丛。分布于印度、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等地。

本种木材适作雕刻; 成熟果实可食; 根可作利尿药用。

2. 大叶鱼骨木 (海南植物志) 图版 4: 5—7

Canthium simile Merr. et Chun in Sunyatsenina 2: 19, fig. 11. 1934; 海南植物志 3: 355. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 268, 图 5950. 1975.