

据台湾有关文献载, 台湾兰屿尚有 *C. gynochthodes* Bail.; 因未见标本, 本志未录。

分种检索表

1. 植物具刺; 核果卵形, 长 15—25 毫米, 直径 10—20 毫米; 叶长 2—3 (5) 厘米, 宽 1—2 厘米 …………… 1. 猪肚木 *C. horridum* Bl.
 1. 植物无刺; 核果多型。
 2. 叶纸质, 卵状长圆形, 长 9—13 厘米, 宽 4.5—6.5 厘米; 聚伞花序有明显的总花梗; 核果长 10—15 (20) 毫米, 直径 9—11 (15) 毫米 …………… 2. 大叶鱼骨木 *C. simile* Merr. et Chun
 2. 叶革质, 干后有光泽; 核果较小。
 3. 叶卵形, 椭圆形至卵状披针形, 长 4—10 厘米, 宽 1.5—4 厘米; 花排成聚伞花序; 果倒卵形或倒卵状椭圆形 …………… 3. 鱼骨木 *C. dicoccum* (Gaertn.) Teysmann et Binnedijk
 3. 叶倒卵形或倒卵状椭圆形, 长 3.3—9 厘米, 宽 2.6—5 厘米; 花 4—6 朵成束, 簇生于叶腋内; 果近球形或椭圆形 …………… 3a. 倒卵叶鱼骨木 var. *obovalifolium* G. A. Fu
1. 猪肚木 (广东) 猪肚筋 (海南澄迈)

Canthium horridum Bl. Bijdr. 966. 1826; Merr. et Chun in Sunyatsenina 2: 46. 1934; 海南植物志 3: 356. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 268, 图 5949, 1975. — *C. parvifolium* auct. non Roxb.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 385. 1888.

灌木, 高 2—3 米, 具刺; 小枝纤细, 圆柱形, 被紧贴土黄色柔毛; 刺长 3—30 毫米, 对生, 劲直, 锐尖。叶纸质, 卵形, 椭圆形或长卵形, 长 2—3 (—5) 厘米, 宽 1—2 厘米, 顶端钝、急尖或近渐尖, 基部圆或阔楔形, 无毛或沿中脉略被柔毛; 侧脉每边 2—3 条, 纤细, 在叶下面稍明显; 叶柄短, 长 2—3 毫米, 略被柔毛; 托叶长 2—3 毫米, 被毛。花小, 具短梗或无花梗, 单生或数朵簇生于叶腋内; 小苞片杯形, 生于花梗顶部; 萼管倒圆锥形, 长 1—1.5 毫米, 萼檐顶部有不明显波状小齿; 花冠白色, 近瓮形, 冠管短, 长约 2 毫米, 外面无毛, 喉部有倒生髯毛, 顶部 5 裂, 裂片长圆形, 长约 3 毫米, 顶端锐尖; 花丝短, 花药内藏或微突出, 长约 5 毫米, 基部被柔毛; 柱头橄榄形, 粗糙。核果卵形, 单生或孪生, 长 15—25 毫米, 直径 10—20 毫米, 顶部有微小宿存萼檐, 内有小核 1—2 个; 小核具不明显小瘤状体。花期 4—6 月。

产广东、香港、海南、广西、云南。生于低海拔的灌丛。分布于印度、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等地。

本种木材适作雕刻; 成熟果实可食; 根可作利尿药用。

2. 大叶鱼骨木 (海南植物志) 图版 4: 5—7

Canthium simile Merr. et Chun in Sunyatsenina 2: 19, fig. 11. 1934; 海南植物志 3: 355. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 268, 图 5950. 1975.