

产广东、香港、海南、广西、云南和西藏的墨脱。常见于低海拔至中海拔疏林或灌丛中。分布于印度、斯里兰卡、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及澳大利亚。

本种木材暗红色，坚硬而重，纹理密致，适宜为工业用材和艺术雕刻品用。

3b. 倒卵叶鱼骨木 (变种) (植物研究)

var. *obovatifolium* G. A. Fu in Bot. Res. 5 (1): 183. 1986.

本变种与原变种 (鱼骨木) 的区别是：叶倒卵形或倒卵状椭圆形；花 4—6 朵成束，簇生于叶腋内；柱头常 2 裂或微缺；果近球形或椭圆形。花期 5—6 月。

产海南屯昌。生于杂木林内。

族 11. 海岸桐族 Trib. 11. Guettardeae DC.

DC. Mémoire sur le Cuviera, genre nouveau de la famille des Rubiacées. Ann. Mus. Hist. Nat. (Paris) 9: 217. 1807, et Prodr. 4: 342, 446. 1830 ("Guettardaceae"); Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 2: 9, 20. 1873; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. IV (4): 95. 1891; S. P. Darwin in Taxon 25 (5/6): 602. 1976.

灌木或乔木。叶对生或稀 3 片轮生；托叶生于叶柄间。花冠裂片覆瓦状或镊合状排列；雄蕊着生在花冠喉部；子房 2 至多室，花柱线形；珠孔向上；胚珠悬垂于子房室顶，珠柄粗厚。核果具 2 至多个分离或合生的分核；种子圆筒状，胚乳肉质、少或无胚乳，具向上的胚根。

模式属：海岸桐属 *Guettarda* Linn.

本族约有 9 属、383 种，分布于马达加斯加经亚洲东南部、大洋洲至热带中、南美洲；尤以热带美洲最盛。我国有 3 属、3 种。

63. 海岸桐属 *Guettarda* Linn.

Linn. Sp. Pl. ed 1, 991. 1753; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 99. 1873.

灌木或乔木。叶对生，罕有 3 枚丛生或轮生，具柄或近无柄，革质或膜质；托叶生于叶柄间。花两性或杂性或杂性异株，偏生于 2 叉状的聚伞花序的分枝的一侧，有小苞片或缺；萼管卵形，球形或杯形，萼檐管形或近钟形，顶端截平或具不规则的小齿，脱落，很少宿存；花冠高脚碟形，管延长，直或弯曲，喉部无毛，顶部 4—9 裂，裂片长