

产广东、海南及香港。生于林下或灌木丛中，在干旱瘦瘠的砾土上植株矮小，叶变细，生长在溪旁或密林下的往往高达3—4米，叶长达8厘米。模式标本采自香港。

据记载本属植物的树皮有退热之效，但尚待证明。

65. 海茜树属* *Timonius* DC. nom. cons.

DC. Prodr. 4: 461. Sep. 1830.

乔木或灌木；小枝圆柱形。叶对生，革质，具叶柄或无柄；托叶在叶柄间，早落。花细小，杂性异株，白色，具香气，组成腋生的聚伞花序，生于雌花序上的常常生于分枝的一侧，在雄花序上的有花1—3朵，中央的无梗；花梗与花萼之间有关节，并具2枚小苞片；花萼倒卵形或球形，萼檐杯形，4—5裂，宿存；花冠革质，漏斗形，外面被毛，里面和喉部常常无毛，顶部4裂，很少5—10裂，厚革质，镊合状排列；雄蕊与花冠裂片同数，生于喉部，花丝极短，花药背着，线状长圆形，突出，顶端突尖，基部短2裂，在雌花中不育；花盘不明显，被粗毛；子房5—10室，花柱短，增厚，被毛，有分枝4—12，线形，常常不等长，有乳头状凸体；胚珠每室1颗，从顶部下垂。核果卵形或球形，有4—5条纵棱，肉质，内有小核数个，每个小核有种子1粒；种子圆柱形，直立或弯曲，倒垂，外种皮膜质，胚乳稀少或缺；胚与种子同型，子叶细小，扁平，胚根延长，圆柱形，向上。

属模式：*T. rumphii* DC.

本属约154—180种，150种产马来西亚、新几内亚岛，2种西达毛里求斯、塞舌尔，1种产安达曼，1种产斯里兰卡。我国台湾省产1种。

1. 海茜树（新拟） 贝木（台湾植物志），梯木（中国种子植物科属辞典） 图版

7

Timonius arboreus Elmer in Leaflet Philipp. Bot. 1: 72. 1906; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 684, f. 640. 1936; Li, Woody Fl. Taiwan 816, fig. 354. 1963; 台湾植物志 4: 338. 1978; C. E. Chang in Journ. Phytogeography Taxon. 29 (1): 20. 1981.

常绿乔木，高5米，有时达12米；小枝粗，有明显、近圆形的叶柄疤痕。叶3枚轮生或对生，很快脱落，椭圆形或随圆状倒卵形，长9—15厘米，宽3—6厘米，顶端钝渐尖，基部狭窄，两面无毛，干后常变暗黄色；侧脉5—7对，在两面均显著；叶柄粗而短，长仅5毫米；托叶阔三角形，早落，被毛，内面被毛比外面的浓密。花单性，异株；花萼长约6毫米，萼管近球形，被绢毛，萼檐5—6裂；花冠长1—1.5厘米，外

* 属的异名：海满树属