

约 400 多种，分布于非洲南部、亚洲热带地区和澳大利亚北部。我国有 6 种和 1 变型，主要分布于西南部和南部。

分 种 检 索 表

1. 花枝绿色或几乎绿色。

2. 叶下面和上面粗糙；花柱长 38 毫米 1. 糙叶大沙叶 *P. scabrifolia* Bremek.

2. 叶两面均不粗糙；花柱长 35 毫米以下。

3. 花枝和子房密被柔毛。

4. 叶狭倒卵形或披针形，长 9—13 厘米，宽 3.5—4.7 厘米；侧脉每边 8 条.....

..... 2. 多花大沙叶 *P. polyantha* R. Br. ex Bremek.

4. 叶狭椭圆形或倒披针形，长 10—13 厘米，宽 5 厘米；侧脉每边 6—7 条

..... 3. 汕头大沙叶 *P. swatouica* Bremek.

3. 花枝和子房均无毛；叶长圆形至椭圆状倒卵形，上面无毛，下面近无毛或沿中脉上和脉腋内被短柔毛 4. 香港大沙叶 *P. hongkongensis* Bremek.

1. 花枝非绿色。

5. 叶厚纸质，椭圆形或椭圆状披针形，长 8—15 厘米，宽 4—9 厘米，上面粗糙，下面被绒毛；侧脉每边 10—12 条 5. 绒毛大沙叶 *P. tomentosa* Roxb. ex Smith

5. 叶膜质，长圆形至倒卵状长圆形，上面无毛，下面被疏长毛；侧脉每边 6—8 条 6. 大沙叶 *P. arenosa* Lour.

1. 糙叶大沙叶（云南种子植物名录）

Pavetta scabrifolia Bremek. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 37: 100. 1934; 云南树木图志，下册：1157. 1991. — *P. indica* Linn. var. *polyantha* auct. non Hook. f.: Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. 3: 412. 1916, pro parte

灌木；嫩枝被柔毛。叶膜质，披针形，长 13—16 厘米，宽 3.2—4.4 厘米，顶端钝尾尖，基部楔形，上面近无毛，但在中脉上粗糙，下面粗糙；侧脉每边 5—6 条；托叶阔三角形，腋内有绢状绒毛；花枝仅具 1 长节，其余的均极短。花序为松散的伞房花序式，有时基部为 1 对叶，被柔毛；花白色，花萼近无毛，萼檐裂片短，长 0.6 毫米；花冠管长 17 毫米，里面无毛，裂片长 5.5 毫米；花柱长 38 毫米，柱头棒形。浆果球形，直径约 5 毫米，顶部有宿存的萼檐。花期 5 至 6 月。

产云南的勐腊、思茅、西畴、马关。生于海拔 900—1300 米的疏林内和沟边。模式标本采自云南思茅。

2. 多花大沙叶（云南种子植物名录）

Pavetta polyantha R. Br. [in Wall. List. 6176. 1828 (nomen nudum)] ex Bremek. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 37: 103. 1934; 云南树木图志，下册：1158.