

花期5月，果期9月。

产海南、广西（十万大山）、云南等省区。生于低海拔丛林或荫蔽杂木林内，有时亦生于旷地砂土上。分布于中南半岛和菲律宾。

6. 白花龙船花（海南植物志） 小龙船花（云南树木图志），小仙丹花（云南种子植物名录） 图版12：8—12

Ixora henryi Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **13**: 178. 1914; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 324. 1924; Chun in Sunyatsenia **1**: 306. 1934; Rehder in Journ. Arn. Arb. **16**: 322. 1935; L. A. Lauener et D. K. Ferguson in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **32** (1): 109. 1972; 海南植物志 **3**: 343. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 260, 图5934. 1975; 云南种子植物名录, 下册: 1257. 1984; 云南树木图志, 下册, 1154. 1991. ——*I. cavaleriei* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 367. 1915, nom. nud. pro syn.


灌木，高1—3米，全部无毛；小枝初时扁圆柱形，老时圆柱形，浅灰色。叶对生，纸质，长圆形或披针形，很少近椭圆形，长5—10（—15）厘米，宽1.5—3（—4）厘米，顶端长渐尖或渐尖，基部楔形至阔楔形；侧脉每边7—8条，在叶片两面稍明显，网脉疏散，不明显；叶柄纤细，长3—7毫米；托叶基部阔，长5—8毫米，近顶部骤然收狭成长3—6毫米的芒尖。花序顶生，多花，排成三歧伞房式的聚伞花序，长6—8厘米，有线形或线状披针形的苞片和小苞片；总花梗短，长5—15毫米；花具梗，两侧的花梗长2—2.5毫米，中央的长1—1.5毫米；萼管长1.8—2毫米，萼檐裂片三角形，短于萼管，长0.8—1毫米，顶端尖；花冠白色，干后变暗红色，盛开时冠管长2.5—3厘米，纤细，顶部4裂，裂片长圆形，长5—6毫米，宽1.6—2毫米，顶端尖；花丝极短，花药突出冠管外，长2.5—3毫米，顶部短尖，基部2裂；花柱长于冠管，柱头2，初时靠合，后又开。果球形，直径0.8—1厘米，顶端有残留、细小的萼檐裂片。花期8—12月。

产广东、海南、广西、贵州、云南等省区。生于500—2000米的杂木林内或林缘潮湿的岩石溪旁。分布于越南。模式标本采自广西。

7. 抱茎龙船花（云南树木图志）

Ixora amplexicaulis C. Y. Wu ex Ko in Guihaia **19** (2): 98. 1999.

小乔木，高6米，胸径8厘米；小枝圆柱形，无毛，干后褐色。叶薄革质或厚纸质，无柄，椭圆形，罕有倒披针形，长13—15厘米，宽5—6厘米，顶端短尖，基部抱茎，两面无毛，干后褐色；中脉在叶面凹陷，侧脉每边10—15条，弯拱向上，近叶缘连结；托叶钻形，长约7毫米。伞房花序顶生，具总花梗，总花梗与花梗均被微柔毛，长1.5—3.5厘米，基部常具长约2厘米、宽5—7毫米、不发育的小叶，第二次分枝长2.5—3厘米，有长1.5—2毫米、钻形的苞片；花具短梗，生于第三分枝上与分枝均为



图版 12 1—7. 海南龙船花 *Ixora hainanensis* Merr.: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花冠展开; 4. 花萼; 5. 子房纵切面和萼裂片; 6. 托叶; 7. 果。8—12. 白花龙船花 *I. henryi* Lévl.: 8. 花枝; 9. 花; 10. 花萼和小苞片; 11. 柱头; 12. 托叶。(余汉平绘)