

棱，顶有宿存萼裂片；果柄长3—8毫米；小核背面凸起，有纵棱。花期4—5月，果期6—翌年2月。

产海南（万宁、陵水、保亭、白沙、琼中、定安）。生于山坡、山谷溪边林中，海拔600—1200米。模式标本采于海南万宁县双溪岙。

4. 美果九节（云南种子植物名录）

Psychotria calocarpa Kurz in Journ. Asiat. Soc. Bengal **41** (2): 315. 1872 et in For. Fl. Brit. Burma **2**: 9. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 173. 1880; Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 415. 1916; Hara et Gould in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal **2**: 206. 1979; 云南种子植物名录，下册：1269. 1984. ——*P. asiatica* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey **2**: 160. 1824, non Linn.

亚灌木，高0.25—1米，具匍匐的根状茎；嫩枝被棕褐色皱曲的柔毛。叶对生，纸质，长圆形、倒卵状长圆形或椭圆状披针形，长9.5—17厘米，宽2.5—7厘米，顶端短尖或渐尖，稀钝，基部楔形，边全缘，干时常呈赤红色，两面无毛，或在下面有疏而紧贴的棕褐色皱曲的柔毛，常沿中脉和侧脉上较密，中脉在上面平或凹下，在下面凸起，侧脉11—15对，在下面凸起，斜上升，在近边缘处结成一明显的边脉；叶柄无毛或有棕褐色皱曲的柔毛，长0.5—4厘米；托叶卵形或近圆形，长约1厘米，宽约8毫米，顶端2裂成钻状长尖，无毛或有棕褐色皱曲的柔毛。聚伞花序小，腋生或顶生，长2—3厘米，宽2—2.5厘米，有花数至10多朵，总花梗有棕褐色皱曲的柔毛；苞片披针形，常脱落；花小，具短花梗；花萼长约2毫米，顶端4裂，萼裂片线状披针形，具缘毛；花冠白色，内面被白色长柔毛，花冠管与萼裂片等长，花冠裂片短，长圆形，顶端稍钝。果椭圆形，橙黄色或红色，果皮薄，长约8.5毫米，直径约6毫米，顶端有宿存的萼；种子椭圆形，在背部不明显地具4棱，长约7毫米，宽约3.5毫米。花期5—7月，果期8—翌年2月。

产云南（思茅、景洪、普洱、红河、潞西）、西藏。生于山坡林中，海拔800—1640米。分布于印度、锡金、不丹、尼泊尔、孟加拉国、缅甸、越南、马来西亚。

据《全国中草药汇编》载：全株入药，功能清热解毒，祛风利湿，镇静，镇痛；能治细菌性痢疾、肠炎腹泻、咳嗽、癫痫、肾炎、膀胱炎、风湿性腰腿痛。

5. 聚果九节（新拟） 假巴戟（云南种子植物名录）

Psychotria morindoides Hutchins. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 414. 1916; Pitard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **3**: 355. 1924; 云南种子植物名录，下册：1269. 1984.

灌木，高0.5—3米；小枝无毛或被卷曲的短柔毛。叶对生，纸质，倒卵状倒披针形或长圆状倒披针形，有时稍弯，长8—30厘米，宽3—11.5厘米，顶端锐渐尖或短尖，基部渐狭，有时不等侧，边全缘，干时暗红色，两面无毛或仅在下面脉上被微柔